



This is a digital copy of a book that was preserved for generations on library shelves before it was carefully scanned by Google as part of a project to make the world's books discoverable online.

It has survived long enough for the copyright to expire and the book to enter the public domain. A public domain book is one that was never subject to copyright or whose legal copyright term has expired. Whether a book is in the public domain may vary country to country. Public domain books are our gateways to the past, representing a wealth of history, culture and knowledge that's often difficult to discover.

Marks, notations and other marginalia present in the original volume will appear in this file - a reminder of this book's long journey from the publisher to a library and finally to you.

### **Usage guidelines**

Google is proud to partner with libraries to digitize public domain materials and make them widely accessible. Public domain books belong to the public and we are merely their custodians. Nevertheless, this work is expensive, so in order to keep providing this resource, we have taken steps to prevent abuse by commercial parties, including placing technical restrictions on automated querying.

We also ask that you:

- + *Make non-commercial use of the files* We designed Google Book Search for use by individuals, and we request that you use these files for personal, non-commercial purposes.
- + *Refrain from automated querying* Do not send automated queries of any sort to Google's system: If you are conducting research on machine translation, optical character recognition or other areas where access to a large amount of text is helpful, please contact us. We encourage the use of public domain materials for these purposes and may be able to help.
- + *Maintain attribution* The Google "watermark" you see on each file is essential for informing people about this project and helping them find additional materials through Google Book Search. Please do not remove it.
- + *Keep it legal* Whatever your use, remember that you are responsible for ensuring that what you are doing is legal. Do not assume that just because we believe a book is in the public domain for users in the United States, that the work is also in the public domain for users in other countries. Whether a book is still in copyright varies from country to country, and we can't offer guidance on whether any specific use of any specific book is allowed. Please do not assume that a book's appearance in Google Book Search means it can be used in any manner anywhere in the world. Copyright infringement liability can be quite severe.

### **About Google Book Search**

Google's mission is to organize the world's information and to make it universally accessible and useful. Google Book Search helps readers discover the world's books while helping authors and publishers reach new audiences. You can search through the full text of this book on the web at <http://books.google.com/>



## Über dieses Buch

Dies ist ein digitales Exemplar eines Buches, das seit Generationen in den Regalen der Bibliotheken aufbewahrt wurde, bevor es von Google im Rahmen eines Projekts, mit dem die Bücher dieser Welt online verfügbar gemacht werden sollen, sorgfältig gescannt wurde.

Das Buch hat das Urheberrecht überdauert und kann nun öffentlich zugänglich gemacht werden. Ein öffentlich zugängliches Buch ist ein Buch, das niemals Urheberrechten unterlag oder bei dem die Schutzfrist des Urheberrechts abgelaufen ist. Ob ein Buch öffentlich zugänglich ist, kann von Land zu Land unterschiedlich sein. Öffentlich zugängliche Bücher sind unser Tor zur Vergangenheit und stellen ein geschichtliches, kulturelles und wissenschaftliches Vermögen dar, das häufig nur schwierig zu entdecken ist.

Gebrauchsspuren, Anmerkungen und andere Randbemerkungen, die im Originalband enthalten sind, finden sich auch in dieser Datei – eine Erinnerung an die lange Reise, die das Buch vom Verleger zu einer Bibliothek und weiter zu Ihnen hinter sich gebracht hat.

## Nutzungsrichtlinien

Google ist stolz, mit Bibliotheken in partnerschaftlicher Zusammenarbeit öffentlich zugängliches Material zu digitalisieren und einer breiten Masse zugänglich zu machen. Öffentlich zugängliche Bücher gehören der Öffentlichkeit, und wir sind nur ihre Hüter. Nichtsdestotrotz ist diese Arbeit kostspielig. Um diese Ressource weiterhin zur Verfügung stellen zu können, haben wir Schritte unternommen, um den Missbrauch durch kommerzielle Parteien zu verhindern. Dazu gehören technische Einschränkungen für automatisierte Abfragen.

Wir bitten Sie um Einhaltung folgender Richtlinien:

- + *Nutzung der Dateien zu nichtkommerziellen Zwecken* Wir haben Google Buchsuche für Endanwender konzipiert und möchten, dass Sie diese Dateien nur für persönliche, nichtkommerzielle Zwecke verwenden.
- + *Keine automatisierten Abfragen* Senden Sie keine automatisierten Abfragen irgendwelcher Art an das Google-System. Wenn Sie Recherchen über maschinelle Übersetzung, optische Zeichenerkennung oder andere Bereiche durchführen, in denen der Zugang zu Text in großen Mengen nützlich ist, wenden Sie sich bitte an uns. Wir fördern die Nutzung des öffentlich zugänglichen Materials für diese Zwecke und können Ihnen unter Umständen helfen.
- + *Beibehaltung von Google-Markenelementen* Das "Wasserzeichen" von Google, das Sie in jeder Datei finden, ist wichtig zur Information über dieses Projekt und hilft den Anwendern weiteres Material über Google Buchsuche zu finden. Bitte entfernen Sie das Wasserzeichen nicht.
- + *Bewegen Sie sich innerhalb der Legalität* Unabhängig von Ihrem Verwendungszweck müssen Sie sich Ihrer Verantwortung bewusst sein, sicherzustellen, dass Ihre Nutzung legal ist. Gehen Sie nicht davon aus, dass ein Buch, das nach unserem Dafürhalten für Nutzer in den USA öffentlich zugänglich ist, auch für Nutzer in anderen Ländern öffentlich zugänglich ist. Ob ein Buch noch dem Urheberrecht unterliegt, ist von Land zu Land verschieden. Wir können keine Beratung leisten, ob eine bestimmte Nutzung eines bestimmten Buches gesetzlich zulässig ist. Gehen Sie nicht davon aus, dass das Erscheinen eines Buchs in Google Buchsuche bedeutet, dass es in jeder Form und überall auf der Welt verwendet werden kann. Eine Urheberrechtsverletzung kann schwerwiegende Folgen haben.

## Über Google Buchsuche

Das Ziel von Google besteht darin, die weltweiten Informationen zu organisieren und allgemein nutzbar und zugänglich zu machen. Google Buchsuche hilft Lesern dabei, die Bücher dieser Welt zu entdecken, und unterstützt Autoren und Verleger dabei, neue Zielgruppen zu erreichen. Den gesamten Buchtext können Sie im Internet unter <http://books.google.com> durchsuchen.

QD

501

W5

cop. 2

OSTWALD'S KLASSIKER  
DER EXAKTEN WISSENSCHAFTEN.

Nr. 29.

UC-NRLF



QB 241 314

ÜBER DAS GESETZ,  
NACH WELCHEM  
DIE EINWIRKUNG DER SÄUREN  
AUF DEN ROHRZUCKER STATTFINDET,  
VON  
LUDWIG WILHELMY.  
(1850.)

---

WILHELM ENGELMANN IN LEIPZIG.

# CROCKER Ankündigung.

Die  
ihrem N.  
Mathema  
den Gebi  
(einschli  
Die  
an der U  
hervorra  
Für die I  
für Astro  
Wange  
für Pflan  
Prof. Dr.  
Der  
textliche

- E  
Nr. 1. H.  
• 2. C.  
ni  
stc  
• 3. J.  
(1  
• 4. Ga  
• 5. C.  
g €  
• 6. E.  
vo  
1  
• 7. F.

- H. DUNB. MIT 6 TAF. (111 S.) M 3.—  
• 8. **A. Avogadro** u. **Ampère**, Abhandlungen zur Molekulartheorie. (1811 u. 1814.) Mit 3 Taf. Herausg. v. W. Ostwald. (50 S.) M 1.20.  
• 9. **H. Hess**, Thermochemische Untersuchungen. (1839—1842.) Herausg. v. W. Ostwald. (102 S.) M 1.60.  
• 10. **F. Neumann**, D. mathem. Gesetze d. inducirten elektrischen Ströme. (1845.) Herausg. v. C. Neumann. (96 S.) M 1.50.  
• 11. **Galileo Galilei**, Unterredungen u. mathematische Demonstrationen über zwei neue Wissenszweige etc. (1638.) 1. Tag mit 13 u. 2. Tag mit 26 Fig. im Text. Aus d. Italien. übers. u. herausg. v. A. v. Oettingen. (142 S.) M 3.—  
• 12. **I. Kant**, Theorie d. Himmels. (1755.) Herausg. v. H. Ebert. (101 S.) M 1.50.  
• 13. **Coulomb**, 4 Abhandlgen über d. Elektrizität u. d. Magnetismus. (1785—1786.) Übers. u. herausg. v. W. König. Mit 14 Textf. (88 S.) M 1.80.



ften umfassen  
lasten, von der  
andlungen aus  
ysik, Chemie  
ie.  
ld, o. Professor  
werden durch  
lasten besorgt.  
onnen worden:  
matik Prof. Dr.  
th (München),  
ig), für Physik  
ohne etwaige

80 *ƒ*.  
lehrten Verhält-  
nungs- und Ab-  
n. (60 S.) 80 *ƒ*.  
ur Atomtheorie.  
f. (30 S.) 50 *ƒ*.  
l. (52 S.) 80 *ƒ*.  
sg. v. A. Wan-  
re auf die Lehre  
f. v. Frey. Mit  
h. Herausg. von

Ueber das Gesetz,

nach welchem die

# EINWIRKUNG DER SÄUREN

auf den Rohrzucker

stattfindet,

von

**LUDWIG WILHELMY**

in Heidelberg.

(1850.)

---

Herausgegeben

von

**W. Ostwald.**



---

LEIPZIG

VERLAG VON WILHELM ENGELMANN

1891.

Q-D 501  
W 5  
22 2.2

gift of

**CROCKER**

Surf-...  
**Main T.M.**



# Ueber das Gesetz, nach welchem die Einwirkung der Säuren auf den Rohrzucker stattfindet.

Von  
**Ludwig Wilhelmy**  
in Heidelberg.

[413] Der die Polarisationsebene des durch seine Auflösung gehenden Lichts nach rechts drehende Rohrzucker wird bekanntlich durch Einwirkung von Säuren in linksdrehenden Schleimzucker verwandelt. Da man nun mit Hilfe eines Polarisationsapparats, namentlich unter Anwendung der *Soleil*'schen Doppelplatte, mit grosser Leichtigkeit und Sicherheit der Ablesung in jedem Augenblicke bestimmen kann, wie weit diese Umwandlung vorgeschritten ist, so schien mir hierdurch die Möglichkeit gegeben, die Gesetze des in Rede stehenden Vorgangs zu ermitteln, andererseits aber die Aufgabe von Interesse, festzustellen, in welcher Weise die chemische Action, wenigstens in diesem speciellen Falle, der aber gewiss nur ein einzelner Repräsentant einer grösseren Reihe von Erscheinungen sein wird, — denn in der Natur folgt Alles allgemeinen Gesetzen — abhängig sei von sämmtlichen ihr Eintreten bedingenden Umständen. <sup>1)</sup>

Ich glaubte, dass man auf diesem Wege werde feststellen können, in welcher Weise diese Action — ähnlich wie der Dampfdruck und die Ausdehnung der Körper — eine Function der Temperatur sei, inwiefern sie — analog der elektrischen und magnetischen Anziehung und Abstossung — ihrem Werth nach abhängig sei von dem Abstände [414] der Theile, wie sie etwa modificirt werden mögen vom Luftdruck und von der Anzahl der sich in wechselseitiger Einwirkung gegenüberstehenden Moleküle.

Ich gestehe gern ein, dass die Natur dieser Versuche, bei denen es auf ein Urtheil des Auges in Vergleichen zweier Farbentöne ankommt, eine unbedingte Genauigkeit der Resultate nicht gestattet, überdies weiss jeder, der sich mit derartigen Arbeiten beschäftigt hat, wie sehr man abhängig ist von der Beschaffenheit des Lichts und der Atmosphäre; dennoch glaube ich, dass meine Beobachtungen durch die auffallende Uebereinstimmung, die sie im Allgemeinen zeigen, genügendes Vertrauen in die Richtigkeit der ermittelten Gesetze gewähren können, wenigstens habe ich, was den einzelnen Beobachtungsergebnissen an Zuverlässigkeit abgeht, durch die grosse Zahl der angestellten Versuche zu ersetzen gesucht. Die in den betreffenden Formeln vorkommenden Constanten werden freilich noch einer Berichtigung bedürfen.

Der Apparat, dessen ich mich bediente, ist von *Soleil* nach den Angaben von *Amici* construirt und findet sich in *Poggendorff's Annalen* Bd. 64, S. 472. Leider befindet sich kein Nonius an der Kreistheilung, so dass die Ablesung, welche oft grössere Genauigkeit zugelassen hätte, in den Bruchtheilen eines Grades nur nach ungefährender Schätzung stattfinden konnte. In Fällen, wo es nicht leicht war, die genaue Farbentübereinstimmung aufzufinden, oder wo diese überhaupt nicht mehr absolut war, wurde, um wenigstens die relativ grösste zu erzielen, eine doppelte Ablesung an den Punkten gleicher Farbdifferenz zu beiden Seiten vorgenommen, und dann das Mittel genommen. Da die Uebereinstimmung am vollkommensten und die Farbennuance am empfindlichsten wird in der Nähe des Nullpunktes, so wurde, so weit es sich thun liess, die Zersetzung immer so lange fortgesetzt, bis die Flüssigkeit nur noch eine geringe Drehung in dem einen oder andern Sinne hervorbrachte. Grosse Drehungen, bei denen, wie *Biot* gezeigt hat, die Färbung beider Plattenhälften nicht [415] wieder zur Gleichheit, auch nicht zur annähernden, zurückgeführt werden kann, wurden ohne Anwendung der Platten auf die gewöhnliche Weise bestimmt \*).

Die Temperaturen wurden constant gehalten mittelst eines

---

\*) Uebrigens bemerkt auch *Biot*, dass bei Drehungen unter 48° die Identität der Bilder noch zu erreichen sei und mit dem Eintreten der *T e i n t e d e p a s s a g e* zusammenfalle. Bei seinen betreffenden Beobachtungen habe er keine Differenzen zwischen den nach der einen oder anderen Methode gemachten Bestimmungen wahrgenommen (*Comptes rend.* T. 20, p. 1757).



kleinen Apparats aus verzinnem Eisenblech, welcher mit einem Umrührer so wie mit einem Thermometer von willkürlicher Theilung (3,039 Div. = 1° C.) versehen war.

Die Glasröhren, welche die Mischungen enthielten, standen in Oeffnungen des Deckels. Das Ganze wurde entweder über eine genau regulirte Spirituslampe gestellt, die ebenso viel Wärme zuführte, als die Wandungen des Gefässes abgaben, oder in ein grösseres hölzernes Geräth versenkt, das mit Wasser von gleicher Temperatur gefüllt war. Uebrigens wurde auf die Constanz der Temperatur, deren grosse Wichtigkeit bald zu erkennen war, die möglichste Sorgfalt verwendet. Die Zahl der Säuren, deren Einwirkung studirt wurde, beschränkte sich vorläufig auf vier, nämlich: Schwefelsäure, Salzsäure, Salpetersäure und Phosphorsäure. Beiläufige Versuche zeigten, dass Oxalsäure ebenfalls den rechtsdrehenden Zucker in linksdrehenden verwandelt, Essigsäure aber, selbst wenn die Mischung in Wasser von 100° versenkt wurde, eine derartige Umkehrung nicht hervorbrachte<sup>2)</sup>; beides ist auch schon durch die Versuche Anderer bekannt.

Die erste Frage, welche sich in Bezug auf diesen Vorgang darbot, war: ob die Säure selber eine Modification erleide und dadurch theilweise unwirksam werde, oder ob sie selbst unverändert bleibend, nur den vorhandenen Zucker durch ihre Gegenwart zu einer anderen Anordnung seiner Bestandtheile disponire. Dass der linksdrehende Zucker nicht etwa die Säure in Verbindung enthalte und [416] dass diese Veränderung im Sinne der Drehung, wenn einmal die entsprechende Modification eingetreten war, nicht mehr abhängig war von der Gegenwart der Säure in der Flüssigkeit, ergab sich aus einem Versuch, durch welchen dargethan wurde, dass eine durch Schwefelsäure modificirte Zuckerauflösung ihr Drehungsvermögen nach links, seinem Werthe nach abhängig von der Temperatur, unverändert beibehielt, nachdem die Schwefelsäure mit kohlensaurem Baryt entfernt war.

Kehren wir zu der erwähnten Frage zurück, so wird es zunächst erforderlich sein, den Vorgang unter der einen oder anderen Annahme durch eine mathematische Formel auszudrücken und dann zu sehen, ob dieselbe mit den Versuchsergebnissen in Uebereinstimmung sei.

Die beim Beginn noch vorhandene Menge rechtsdrehenden Zuckers sei  $Z_0$ , die Säuremenge  $S_0$ , der Umwandlungcoefficient des Zuckers für die Zeiteinheit sei  $M$ ; setzt man nun voraus:

1) dass die Säure ebenfalls modificirt, d. h. theilweise unwirksam werde, und nennt man ihren Veränderungscoëfficient  $N$ , so findet man die Zuckerverluste in den auf einander folgenden Zeiteinheiten:

$$V_1 = MZ_0 S_0, V_2 = MZ_1 S_1, V_3 = MZ_2 S_2 \text{ etc.}$$

ebenso die Säureverluste:

$$v_1 = NZ_0 S_0, v_2 = NZ_1 S_1, v_3 = NZ_2 S_2 \text{ etc.}$$

Es ist aber:

$$Z_1 = Z_0 - V_1, Z_2 = Z_1 - V_2 \text{ etc.}$$

$$S_1 = S_0 - v_1, S_2 = S_1 - v_2 \text{ etc.}$$

oder

$$Z_1 = Z_0 (1 - MS_0) = Z_0 - \Delta Z$$

$$S_1 = S_0 (1 - NZ_0) = S_0 - \Delta S,$$

mithin

$$Z_2 = Z_1 (1 - MS_1) = (Z_0 - \Delta Z) [1 - M(S_0 - \Delta S)]$$

oder, wenn man das Product der beiden sehr kleinen Grössen  $M$  und  $\Delta S$  vernachlässigt:

$$Z_2 = Z_0 (1 - MS_0)^2.$$

[417] Ebenso:

$$S_2 = S_1 (1 - NZ_1) = S_0 (1 - NZ_0) [1 - N(Z_0 - \Delta Z)] \\ = S_0 (1 - NZ_0)^2,$$

daher:

$$V_1 = MZ_0 S_0, V_2 = MZ_0 S_0 (1 - MS_0) (1 - NZ_0) \\ V_3 = MZ_0 S_0 (1 - MS_0)^2 (1 - NZ_0)^2 \text{ etc. etc.}$$

und die Summe aller Verluste in der Zeit  $T$ :

$$V = \int_0^T MZS (1 - MS)^x (1 - NZ)^x dT.$$

$$V = \frac{MZS [(1 - MS)^T (1 - NZ)^T + C]}{l : (1 - MS) + l : (1 - NZ)}.$$

Da für  $T = 0$   $V = 0$ , so ergibt sich  $C = -1$  und

$$V = \frac{MZS [1 - (1 - MS)^T (1 - NZ)^T]}{NZ + MS},$$

wenn man unter Berücksichtigung des unendlich kleinen Werthes von  $M$  und  $N$  die Logarithmen durch das erste Glied der entsprechenden Reihen ausdrückt. Nach langen Zeiträumen wird dann:

$$V = \frac{M Z S}{N Z + M S}$$

und wenn man den unverändert gebliebenen Zucker mit  $R$  bezeichnet:

$$R = Z - V = \frac{N Z^2}{N Z + M S} = \frac{Z}{1 + \frac{M S}{N Z}}$$

Unter der gemachten Voraussetzung würde  $R$  niemals = 0 werden können, auch würde sein Werth abhängig sein von dem Bruch  $\frac{M S}{N Z}$ , mithin von der angewendeten Säuremenge  $S$ . Die in Tabelle I zusammengestellten Versuche beweisen, dass letzteres nicht der Fall, mithin die gemachte Annahme unzulässig ist, die Säure daher unverändert bleibt und nur der Zucker modificirt wird.

[418]                      Tabelle I.

Z.	S.	T.	D.
+ 23°,25	3 g Salzsäure	100h	— 7°,5
"  "	2 g   "  "	"  "	— 7°,5
"  "	1 g   "  "	"  "	— 7°,5
+ 45°	2 g   "  "	144h	— 15°,25
"  "	1 g   "  "	192h	— 14°,75
"  "	0,5 g   "  "	"  "	— 15°

(Darin bedeutet  $D$  die Ablesung nach der Zeit  $T$ .)

Unter dieser letzteren Voraussetzung kann man aber die Formel, welche den chemischen Vorgang darstellt, in folgender Weise entwickeln:

Es seien die oben eingeführten Bezeichnungen beibehalten, dann ist  $dZ$  der Zuckerverlust in dem Zeit-Element  $dT$  und zwar nehme man an, derselbe sei bestimmt durch die Formel:

$$-\frac{dZ}{dT} = M Z S,$$

worin  $M$ , wie vorher, den mittleren Werth der unendlich kleinen Quantität der Zuckereinheit bedeutet, welche im Zeitelement durch die Einwirkung jeder vorhandenen Säureeinheit umgewandelt wird. <sup>3)</sup>

Obige Gleichung giebt durch Integration:

$$\log Z = -\int_0^T M S dT,$$

oder da, wie bereits gezeigt,  $S$  constant, andererseits auch  $M$  unabhängig ist von  $Z$  und daher zugleich von  $T$ , welches später noch durch Versuche nachgewiesen werden soll:

$$\log Z = -MST + C.$$

Für  $T = 0$  ist  $Z = Z_0$ , mithin:

$$lZ_0 - lZ = MST \text{ oder } Z = Z_0 e^{-MST}$$

Dieser letzteren Formel wird man sich, da darin  $Z_0$ ,  $S$  und  $T$  gegeben,  $Z$  durch den Versuch bekannt ist, zur Bestimmung von  $M$  bedienen können, wobei indess zu bemerken [419] ist, dass die erhaltenen endlichen Werthe zugleich noch einen unendlich grossen Factor, nämlich die Anzahl der in der Zeiteinheit enthaltenen Zeitelemente, einschliessen.

Die hier gestellte Aufgabe wird nun darin bestehen, zu ermitteln, ob und in welcher Weise  $M$  abhängig sei von den verschiedenen physikalischen Bedingungen des Vorganges, also ob und in welcher Art  $M$  eine Function sei der Zeit, der Zuckermenge, der Säuremenge, der Menge des Auflösungsmittels, der Qualität der Säure, der Temperatur und des Luftdrucks. Diese Fragen zu beantworten, soll in dem Folgenden der Reihe nach versucht werden.

Zuvor ist aber noch ein für die Berechnung der Versuche wichtiger Punkt zu erörtern. Durch die Einwirkung der Säure auf den Zucker wird bekanntlich nicht nur ein Antheil des rechtsdrehenden Zuckers fortgenommen, sondern auch in entgegengesetzt drehenden verwandelt. War mithin die Drehung ursprünglich  $= Z^0$ , so wird sie, nachdem ein um  $X^0$  drehendes Zuckerquantum umgewandelt worden, nur noch  $= (Z - X - \mu X)^0$  sein. Um aus dieser durch Beobachtung gegebenen Grösse  $X$  selbst zu finden, wird man  $\mu$  kennen müssen. *Biot* hat für  $\mu$ , d. h. für die Grösse, welche angiebt, um wie viel eine Zuckermenge, die um  $1^0$  rechtsdrehend wirkte, nach der Umkehrung links dreht, den Namen des Inversionscoëfficienten eingeführt. Mit  $X$  ergibt sich dann auch  $Z = Z_0 - X$ . Die Bestimmung des Inversionscoëfficienten hat mir Anfangs Schwierigkeiten gemacht, auch *Biot* ist in seinen Angaben

über denselben schwankend gewesen. In seiner Arbeit über den Zuckergehalt des Mais<sup>\*)</sup> giebt er für  $\mu$

$$\begin{aligned} \text{für Salzsäure} &= 0,38 \\ \text{für Schwefelsäure} &= 0,3867, \end{aligned}$$

bemerkt aber selbst, dass er sehr abweichende Resultate erhalten habe, die er indess auf verschiedene Reinheit des Zuckers schieben zu können meint. In einem späteren Aufsatz<sup>\*\*)</sup> giebt er sodann:

$$\begin{aligned} [420] \quad \text{für Schwefelsäure } \mu &= 0,417 \\ \text{für Salpetersäure } \mu &= 0,394 \\ \text{für Salzsäure } \mu &= 0,38. \end{aligned}$$

Hierbei ist zunächst zu bemerken, dass *Biot*, so viel mir bekannt ist, sich nicht darüber ausspricht, für welche Temperatur diese Coëfficienten gelten sollen; da aber das Drehungsvermögen des Schleimzuckers abhängig ist von der Temperatur, so muss auch der Werth von  $\mu$  nach der Temperatur der Ablesung verschieden ausfallen. Will man daher den Werth von  $\mu$  für jede Temperatur kennen, so muss man zunächst das Gesetz ermitteln, nach welchem das Drehungsvermögen des Schleimzuckers von der Temperatur abhängig ist.

So viel mir bekannt, existiren über diese Abhängigkeit keine genauen Versuche. *Clerget* berücksichtigt zwar dieselben beim Aufstellen seiner Tabellen<sup>\*\*\*)</sup> theilt aber keine Versuchsreihe mit, worauf er seine Annahmen über das in Rede stehende Gesetz begründet hätte. Unter diesen Umständen schien es mir nothwendig, mir über diesen Gegenstand durch einige Versuche Auskunft zu verschaffen.

Somit ergaben sich mir als unerlässliche Ergebnisse für die Hauptfrage:

- 1) die Ermittlung des Gesetzes, nach welchem das Drehungsgesetz des Schleimzuckers von der Temperatur abhängt;
- 2) die Bestimmung des Umkehrungscoëfficienten.

Ich lasse die Resultate, zu denen ich über diese beiden Punkte gelangt bin, nachstehend folgen.

<sup>\*)</sup> Comptes rend. 15, 529.

<sup>\*\*)</sup> Comptes rend. 17, 757.

<sup>\*\*\*)</sup> Ann. de chim. et de phys. Sér. III. T. 26, p. 201.

1. Gesetz, nach welchem das Drehungsvermögen des Schleimzuckers von der Temperatur abhängt.

Ich liess mir zu den hierauf bezüglichen Versuchen einen kleinen Apparat construiren, welcher mir gestattete, die Temperatur der Zuckerlösung auf dem Polarisationsapparat genau zu bestimmen und möglichst constant zu erhalten. Ein dünnes Silberrohr, von 250 mm Länge und 10 mm [421] innerer Oeffnung, stand in der Axe einer 57 mm weiten Holzbüchse, welche oben und unten mit aufzuschraubenden Messingkappen versehen war. Letztere waren passend durchbohrt, so dass ein Thermometer (das oben erwähnte mit willkürlicher Scale) und eine Umrührvorrichtung angebracht werden konnte. Die Zuckerlösung war mit Salzsäure umgekehrt worden, da ich mir aber leider kein chemisch reines Silberrohr verschaffen konnte, so wurde die Säure nach beendigter Einwirkung mit Natron gesättigt, nachdem ich mich überzeugt hatte, dass dadurch das Drehungsvermögen der Flüssigkeit und der Einfluss der Temperatur auf dasselbe nicht beeinträchtigt wurde. Dies hatte überdies noch den Vortheil, mich gegen eine ferne Wirkung der Säure auf den Zucker sicher zu stellen, welche jedenfalls die Versuche unzuverlässig gemacht haben würde. Das Silberrohr war oben und unten mit aufgekitteten Glasplatten verschlossen. Die Büchse wurde mit Wasser gefüllt und auf den Träger des Polarisationsapparates gestellt, dann konnte mit Leichtigkeit und fast gleichzeitig, nach erfolgtem Umrühren des erwärmten Wassers, die Temperatur und die Drehung abgelesen werden. Man gab dem Wasser im Anfange des Versuchs die höchste Temperatur, welche der Kitt ertrug, und liess es dann allmählich erkalten, indem man von Zeit zu Zeit einen Theil des Wassers mit einer Pipette entfernte, Eiswasser und Eis hinzusetzte, anhaltend umrührte und dann die Beobachtung anstellte. Die Mittheilung der Temperatur von der äusseren Flüssigkeit an die Zuckerauflösung im Innern des dünnen und engen Silberrohres ging sehr schnell von Statten, wenigstens habe ich immer wahrgenommen, dass jede Temperaturerniedrigung sofort auch eine Drehungszunahme zur Folge hatte. In der nachstehenden Tafel gebe ich die Resultate der Versuchsreihen, der beiden letzten, welche ich angestellt habe.

[422]

Tabelle II.

Scalen- Thermo- meter.	Drehung		Diffe- renz.	Scalen- Thermo- meter.	Drehung		Diffe- renz.
	beob- achtet.	berech- net.			beob- achtet.	berech- net.	
+ 250 *)	190	190,11	+ 0,11	+ 171,5	280,75	280,88	+ 0,13
+ 248	19,5	19,36	- 0,14	169,75	29,5	29,11	- 0,39
+ 241,5	20,25	20,17	- 0,08	160,5	30,5	30,25	- 0,25
241	20,5	20,23	- 0,27	+ 156,5	30,5	30,75	+ 0,25
+ 237	21	20,73	- 0,27	152,5	31,5	31,25	- 0,25
234	21	21,10	+ 0,10	150	31,56	31,56	- 0,00
+ 232	21,5	21,25	- 0,25	+ 148,5	31,75	31,75	+ 0,00
229	22	21,72	- 0,28	148	32,5	31,81	- 0,69
224	22,5	22,35	- 0,15	+ 142,5	32,25	32,49	+ 0,24
+ 222	22,5	22,60	+ 0,1	141,5	33	32,62	- 0,38
+ 218	23,49	23,09	- 0,4	+ 134	33	33,55	+ 0,55
213,5	24	23,65	- 0,35	132,5	34,25	33,74	- 0,51
+ 206	24,5	24,59	+ 0,09	+ 129	34	34,18	+ 0,18
198	26	25,58	- 0,42	127,5	35	34,36	- 0,64
+ 194	26	26,08	+ 0,08	+ 121	35	35,17	+ 0,17
188	27	26,83	- 0,17	+ 115,5	35,5	35,85	+ 0,35
+ 184	28	27,33	+ 0,67	+ 113,5**)	36	36,10	+ 0,10
177	28,5	28,20	- 0,3				

Die mit einem + bezeichneten Beobachtungen gehören der zweiten Versuchsreihe an.

Zwei frühere Reihen gaben ähnliche, jedoch nicht ganz so übereinstimmende, Resultate, wovon aber der leicht ersichtliche Grund in Vernachlässigung kleiner Vorsichtsmaassregeln zu suchen war. Ich hätte die Versuchsreihen gern bis 0° und unterhalb ausgedehnt, doch hinderte mich daran, obwohl die Auflösung noch bei - 10° vollkommen flüssig blieb, das Bethauen der Glasplatten; bei niedriger äusserer Temperatur werde ich diesen Mangel zu ergänzen suchen.

Auf der Scale des angewandten Thermometers lag der Punkt des schmelzenden Eises bei 91,5 Div., 1° C. war = 3,039 Div. Aus einer gegebenen Drehung  $D$  bei  $x$  Div. kann man die Drehung  $A$  bei  $y$  Div. berechnen nach der Formel:

$$A = D [1 - 0,003945 (y - x)].$$

So sind die auf der Tabelle II. zusammengestellten Werthe gefunden, [423] welche mit dem durch Beobachtung ermittelten

\*) 250 Scalentheile = 520,15.

\*\*\*) 113,5 Scalentheile = 60,91.

sehr gut übereinstimmen. Für die Berechnung wurde  $x = 150$  genommen. Führt man statt der Scalenabtheilungen Centesimalgrade ein, so verwandelt sich die Formel in:

$$A = D [1 - 0,012 (\tau - t)],$$

wonach man also die Drehung  $A$  des Zuckers bei  $\tau^0$ , aus der bekannten Drehung  $D$  bei  $t^0$  berechnen kann, was dem von *Clerget* angewandten Werth sehr nahe zu kommen scheint. Darnach kann man dann auch die Werthe des Umkehrungscoefficienten für alle Temperaturen aus dem für eine Temperatur  $t$  gefundenen sehr leicht bestimmen. Sind nämlich  $\mu$  und  $D$ ,  $\mu'$  und  $A$  Coefficienten und Drehung für  $t^0$  und  $\tau^0$ , so ist:  $\mu = \frac{D}{Z}$ , worin  $Z$  die ursprüngliche Drehung nach Rechts bedeutet; ferner:

$$\mu' = \frac{A}{Z} = \frac{D[1 - 0,012 (\tau - t)]}{Z}$$

$$\mu' = \mu [1 - 0,012 (\tau - t)].$$

Dieser Formel habe ich mich bei Berechnung meiner Versuche bedient, um den Umkehrungscoefficienten für die Temperatur der Beobachtung aus dem für  $15^0$  bekannten zu berechnen.

## 2. Bestimmung der Umkehrungscoefficienten.

Bei der Bestimmung der Grösse  $\mu$  für die verschiedenen Säuren erhielt ich anfangs in zahlreichen Versuchen fortwährend schwankende Werthe und zwar stets kleinere als die von *Biot* angegebenen, offenbar, weil es mir nicht gelang, den rechten Moment der beendigten Einwirkung zu erfassen, die Beobachtung vielmehr bald zu früh, bald zu spät angestellt war. Endlich kam ich auf den Gedanken, sehr grosse Säuremengen zur Umwandlung des Zuckers anzuwenden; so mischte ich 10 g der Zuckerauflösung (Zuckergehalt: 4854 mg) mit

5 g Schwefelsäure (spec. Gew. = 1,8403)  
 oder 6 g Salpetersäure (spec. Gew. = 1,2004)  
 oder 6 g Salzsäure (spec. Gew. = 1,1201).

[424] Die Umkehrung war dann sehr schnell beendet, ich konnte den ganzen Vorgang im Polarisationsapparat selbst verfolgen und mit Leichtigkeit den Punkt des Maximums der Drehung nach links bestimmen. Ich führe die mit Schwefelsäure angestellte Beobachtungsreihe nachstehend auf:



Drehung nach rechts vor der Mischung:  $36^{\circ},5$

die Mischung erfolgte um  $6^h\ 3'$

Beobachtung, Drehung

nach links um	$6^h\ 18'$	$12^{\circ}$	$(T = 20^{\circ},5)$
	$6^h\ 30'$	$13^{\circ},5$	
	$6^h\ 37'$	$14^{\circ}$	$(T = 21^{\circ})$
	$7^h\ 45'$	$14^{\circ}$	
	$8^h\ 45'$	$14^{\circ},25$	$(T = 22^{\circ})$
	$9^h\ 45'$	$14^{\circ}$	$(T = 22^{\circ},5)$
	$2^h\ 45'$	$13^{\circ}$	$(T = 21^{\circ},5)$
	$3^h\ 55'$	$13^{\circ},25.$	

Reducirte ich die bei der Temperatur der Ablesung gefundenen Werthe von  $\mu'$  auf die Normaltemperatur  $15^{\circ}$ , so ergab sich mir:

für Schwefelsäure  $\mu = 0,425$

für Salpetersäure  $\mu = 0,399$

für Salzsäure  $\mu = 0,386.$

Diese Zahlen weichen nur in der dritten Stelle von den *Biot'schen* ab; eine Temperaturveränderung von weniger als  $1^{\circ}$  entspricht schon dieser Differenz, ich begnügte mich daher mit dem gefundenen Werthe, ohne eine Wiederholung der Versuchsreihen anzustellen, da es ohnehin zur Erzielung einer grösseren Schärfe in der Bestimmung von  $\mu$  nothwendig sein würde, mit längeren Flüssigkeitssäulen zu arbeiten (die von mir angewendete Röhre hatte eine Länge von 150 mm), überdies auch kleine Veränderungen von sehr geringem Einfluss auf die Berechnung sind. Für Phosphorsäure, mit welcher ich wegen der Langsamkeit ihrer Einwirkung nicht auf gleiche Weise verfahren konnte, nahm ich der Analogie nach und in Folge anderweitiger Beobachtungen:  $\mu = 0,45.$ <sup>4)</sup>

[425] Nach diesen Vorarbeiten kann ich jetzt dazu übergehen, die im Früheren entwickelte Formel:

$$lZ_0 - lZ = MST$$

auf die angestellten Versuche anzuwenden.

#### A. Einfluss der Zeit.

Es wurden 10 g Zuckerlösung (Drehung  $46^{\circ},8r$ ) mit 2 g Salpetersäure (spec. Gew. 1,2042) gemischt und in dem Apparat (Röhrenlänge 150 mm, Inhalt 13850 mg destill. Wasser bei  $15^{\circ}$ ) der Verlauf der Einwirkung während eines Tages beobachtet. Die Ablesungen gaben folgende Reihen von Drehungswerthen, wobei zu bemerken ist, dass die Temperatur des Raumes und

der Flüssigkeit beim Beginn der Beobachtung =  $15^{\circ},5$  war, sich allmählich ein wenig erhöhte, um  $1^h 30'$  ihr Maximum bei  $18^{\circ}$  erreichte, und dann bis zum Schluss des Versuchs langsam auf  $14^{\circ},5$  sank. Dem entsprechend wurden die Reste mit dem Umkehrungscoefficienten  $\mu = 0,3966$  abnehmend bis  $0,3846$  und wachsend bis  $0,404$  berechnet; so erhielt man die Werthe des Ausdrucks

$$\frac{\log Z - \log Z}{M S}$$

Bei der Berechnung wurden der Bequemlichkeit halber brigge. Logarithmen angewendet, was ohne Nachtheil geschehen konnte, da es nur auf das Verhältniss der Zahlen zu einander, nicht auf deren absolute Werthe ankommt. Die so gefundenen Zahlen sind in Tabelle III. zusammengestellt.

[426]

Tabelle III.

T.	Drehung.	$\frac{\log Z_0 - \log Z^*)}{M \cdot S}$	t.
	+ $46^{\circ},75$ vor der Mischung		
	Mischung der Säure mit der Zuckerlösung		
8h	+ $43^{\circ},75$		$15^{\circ},5$
8h 15'	+ 41		
» 30	+ $38,25$		
» 45	+ $35,75$	0,0801671	
9h	+ $33,25$		
9h 15	+ $30,75$		
» 30	+ $28,25$		
» 45	+ 26	0,1661271	
10h	+ 22		
10h 30	+ $18,25$	0,2504869	
11h	+ 15		
11h 30	+ $11,5$	0,3393678	
12h	+ 8,25		
12h 30	+ 2,75	0,4882238	$18^{\circ}$
1h 30	- 1,75	0,5859208	$16^{\circ}$
2h 30	- 4,5	0,6628879	
3h 30	- 7	0,7470561	$15^{\circ}$
4h 30	- $8,75$	0,8173016	
5h 30	- 10	0,8752936	$14^{\circ},5$
6h 30			

\*) Z wird aus der beobachteten Drehung D gefunden nach der Formel:

$$Z = Z_0 - \frac{Z_0 - D}{1 + \mu}$$

Wie man sieht, sind die gefundenen Zahlen den abgelaufenen Zeiten sehr nahe proportional, wodurch die Richtigkeit der Formel:  $Z = Z_0 e^{-MST}$  in Beziehung auf  $T$  bestätigt wird. Die kleine Abweichung von der Proportionalität ist aus den Temperaturschwankungen zu erklären, worauf ich noch näher zurückkommen werde. Eine nothwendige Folge der Gleichung ist übrigens, dass  $Z$  erst für  $T = \infty$  Null werden kann, mithin die Umwandlung des Zuckers, streng genommen, niemals beendigt ist, wenngleich sehr bald wegen der Kleinheit des Restes eine weitere Abnahme unmerklich ist.

### B. Einfluss der Zuckermenge.

Es ist schon früher bemerkt worden, dass der Umwandlungskoeffizient  $M$  unabhängig ist von der Zuckermenge; [427] dies ergibt sich aus der bereits mitgetheilten Beobachtungsreihe. Berechnet man nämlich für jeden Zeitabschnitt  $M$  mittelst der Formel:

$$M = \frac{\log Z_0 - \log Z}{T} \cdot \frac{1}{t}$$

so erhält man folgende Werthe:

$M = 0,0204467 \cdot \frac{1}{t}$	$(t = 15^\circ, 5)$
$M = 0,0197215$	»
$M = 0,0204460$	»
$M = 0,0195529$	»
$M = 0,0204748$	»
$M = 0,0214880$	»
$M = 0,0226069$	»
$M = 0,0213903$	»
$M = 0,0210030$	»
$M = 0,0202667$	»
$M = 0,0241737$	»
$M = 0,0240091$	»
$M = 0,0252094$	$t = 18^\circ$ (Maximum der Temperatur)
$M = 0,0244242$	»
$M = 0,0192418$	»
$M = 0,0210170$	»
$M = 0,0175614$	»
$M = 0,0142906$	$t = 14^\circ, 5.$

Die geringen Schwankungen im Werthe von  $M$  entsprechen der Temperatur, deren Einfluss in einem besonderen Abschnitt nachgewiesen werden soll; somit bleibt also  $M$  constant, während die in der Flüssigkeit befindliche Zuckermenge von 46,75 bis 6,23 abgenommen hat.

Die Unabhängigkeit der Grösse  $M$  von der Zuckermenge wurde noch durch besondere Versuche nachgewiesen. Man ermittelte aus jedem der gleichzeitig und bei gleicher Temperatur angestellten Versuche, wobei ausserdem die Säuremenge  $S$  und die Wassermenge  $W$  in den Mischungen constant war,  $M$  mittelst der Formel  $\log Z_0 - \log Z = MST$ . Die näheren Umstände und Resultate ergeben sich aus Tabelle IV.

[428]

Tabelle IV.

$Z_0$	Wasserfreie Salpeters. $S$ .	$W$ .	$T$ .	$D$ .	$M$ .
45°	0,281 g	7,542 g	13 <sup>h</sup>	+ 4°,25	0,1240
36	»	»	»	+ 3	0,1267
27	»	»	»	+ 2	0,1290
18	»	»	»	+ 1,25	0,1301
9	»	»	»	+ 1	0,1201

$Z$  ist, wie immer, mittelst  $D$  aus der vorerwähnten Formel

$$Z = Z_0 - \frac{Z_0 - D}{1 + \mu},$$

berechnet.

### C. Einfluss der Quantität der Säure und des Lösungsmittels. <sup>5)</sup>

[499] Versuche, bei denen ich die Menge der auf den Zucker einwirkenden Säure veränderte, liessen mich bald erkennen, [500] dass die Grösse  $\frac{l Z_0 - l Z}{T} = MS$  nicht  $S$  proportional, sondern schneller als dieses zunimmt. Andererseits nahm ich auch wahr, wie dies vorauszusehen ist, dass der Werth jener Differenz wächst mit abnehmender Verdünnung der Flüssigkeit, also mit abnehmender Menge des Lösungsmittels, des Wassers. Setzte ich aber  $M$ , den Umwandlungscoefficienten  $= \frac{M}{w}$ , mit  $w$  das Gewicht des Wassers in Grammen bezeichnend, so ergab

sich zwar eine annähernde, doch nicht vollkommene Uebereinstimmung mit den Versuchen, und zwar waren die Abweichungen ihrem Sinne nach so entschieden, dass ich sie trotz ihres geringen Betrages Ungenauigkeiten der Beobachtung nicht wohl zuschreiben konnte. Zahlreiche Wiederholungen meiner Versuche liessen mich indess erkennen, dass der vollkommene Aus-

druck für  $M$  sein müsse:  $M = \frac{S}{w} m a^w$ , durch  $a$  eine für die

verschiedenen Säuren verschiedene Constante bezeichnend. Die Richtigkeit dieser Annahme mag, aus den nachfolgend mitgetheilten Resultaten erhellen, welche zugleich zur Bestimmung der Werthe von  $a$  benutzt worden sind. Es wurden nämlich die aus den Beobachtungen jeder einzelnen Reihe erhaltenen Werthe für

$M = m a^w$  mit einander combinirt, wobei, da die Mischungen jeder einzelnen Reihe während der ganzen Dauer des betreffenden Versuchs denselben Temperatureinflüssen unterworfen gewesen waren,  $m$  — eine noch näher zu bestimmende Function der Temperatur — für jede combinirte Gruppe constant angenommen werden musste.

Aus sämmtlichen für jede der drei Säuren erhaltenen Werthen von  $\log a$  wurden die arithmetischen Mittel genommen, und so gelangte man zu folgenden Zahlen:

für Salzsäure	$\log a = 4,09170$
für Salpetersäure	$\log a = 2,8222$
für Schwefelsäure	$\log a = 2,2243$
für Phosphorsäure	$\log a = 0,41551.$

[501] Unter  $S$  ist immer die Menge der wasserfreien Säure in Grammen ausgedrückt zu verstehen. — Indem man sodann diese

Werthe in die verschiedenen Gleichungen  $M = m a^w$  substituirt, erhielt man für jede Versuchsreihe eine der Zahl der Beobachtungen entsprechende von Werthen für  $m$ , aus welchen ebenfalls das Mittel genommen wurde. So ergab sich:

für Salzsäure: Versuchsreihe I.	$m = 2,118$	$t = 17^\circ$
„ II.	$m = 1,521$	$t = 17^\circ$
„ III.	$m = 1,681$	$t = 16^\circ,5$
„ IV.	$m = 1,579$	$t = 16^\circ,5$

für Salpetersäure: Versuchsreihe I.	$m = 0,9905$	$t = 16^{\circ}$
» II.	$m = 0,9905$	$t = 16^{\circ}$
» III.	$m = 1,373$	$t = 18^{\circ},5$
für Schwefelsäure: » I.	$m = 0,7764$	$t = 17^{\circ}$
» II.	$m = 0,8508$	$t = 18^{\circ}$
für Phosphorsäure: » I.	$m = 0,1752$	$t = 19^{\circ},57$
» II.	$m = 0,17103$	$t = 19^{\circ},25.$

Die Werthe von  $m$  nehmen mit der Temperatur zu, wie sich noch näher aus dem Späteren ergeben wird; übrigens ist auf die hier gefundenen Zahlen in dieser Beziehung kein besonderer Werth zu legen, weil die Temperatur nicht gerade streng constant gehalten wurde, was in diesem Falle nicht nöthig war, wo es nur auf ein Sichgleichbleiben der Temperatureinflüsse für sämtliche, in ein grosses Gefäss voll Wasser mittlerer Temperatur versenkte Glasröhren, in denen sich die Mischung befand, ankam.

Mit den so bestimmten Werthen von  $a$  und  $m$  wurde sodann

aus der Formel  $\log Z_0 - \log Z = \frac{m a^{\frac{s}{w}}}{w} ST$ ,  $Z$  berechnet.

Auch hier konnte, wie leicht ersichtlich, der Bequemlichkeit wegen mit *Brigg'schen* Logarithmen gerechnet werden. Waren die Constanten mit hinreichender Genauigkeit bestimmt, so mussten, wenn anders die Formel den Vorgang und seine Bedingungen richtig ausspricht, durch diese Rechnung, die unmittelbar aus dem Versuch [502] mit Hilfe der Gleichung  $Z = Z_0 - \frac{Z_0 - D}{1 + \mu}$  gefundenen Werthe wieder erhalten werden. In wie weit dies der Fall sei, wird man aus den Zusammenstellungen für die vier Säuren auf Tabelle V, VI, VII und VIII\*) ersehen, wo neben einer Uebersicht der einzelnen Versuchsreihen auch die aus der Beobachtung und aus der Formel berechneten Werthe von  $Z$  sich finden. Ich glaube, dass nur wenige Differenzen zwischen Rechnung und Beobachtung die bei diesem Versuch unvermeidliche Fehlergrenze überschreiten. Welcher Art die Fehlerquellen seien und wie gross ihr Einfluss etwa anzunehmen sein möchte, darüber glaube ich an dieser Stelle einige Bemerkungen einschalten zu müssen. Es können zunächst dabei Fehler unterschieden werden, Fehler des Versuchs und

\*) Am Schlusse der Abhandlung.

Fehler der Beobachtung. Was die ersteren anbetrifft, so sind etwaige kleine Fehler der Wägung wohl zu vernachlässigen; dagegen ist der Verlust in den Gefässen, der, da man mit bestimmten, oft sehr kleinen Wassermengen arbeitet, nicht ganz zu vermeiden ist, gewiss von merkbarem Einfluss. Am erheblichsten sind die Differenzen, welche durch Temperatur-Veränderungen entstehen können. Erwärmung der Röhre durch die Hand im Augenblick der Mischung suchte ich zwar möglichst zu vermeiden, überhaupt bei allen einzelnen Versuchen jeder Reihe recht gleichmässig zu verfahren; dennoch sind merkbare Störungen und Abweichungen gewiss nicht ausgeblieben, um so mehr, da kleine Temperaturschwankungen schon so grosse Veränderungen im Werth von  $m$  hervorbringen, Differenzen von  $5^{\circ}$  denselben ungefähr verdoppeln.

Der Fehler der Ablesung ist ein doppelter, der sich im ungünstigen Fall addiren kann, der Fehler bei Bestimmung des Nullpunkts und der Fehler der Ablesung selbst. Bisweilen namentlich in den Nachmittagsstunden schwankte der Nullpunkt so, dass ich nicht im Stande war, zuverlässige Beobachtungen anzustellen. Ich habe vor und nach jeder Ablesung den Nullpunkt genommen, um mich [503] wenigstens gegen jeden grösseren Fehler sicher zu stellen. Leider konnte, wegen Mangels eines Nonius, die Ablesung mit meinem Instrument nicht die ganze Schärfe erhalten, deren sie wenigstens in geringen Abständen vom Nullpunkt fähig ist. Eine besondere Fehlerquelle tritt noch bei der Schwefelsäure hinzu durch die Erwärmung beim Mischen mit Wasser. Ich bin zwar in dieser Beziehung mit aller möglichen Vorsicht verfahren; dennoch vermute ich, dass diesem Umstande die etwas grösseren Abweichungen bei den Versuchen mit dieser Säure zugeschrieben werden müssen. Nach dem Vor erwähnten glaube ich, dass man einen Fehler von  $1^{\circ}$ , worin  $0^{\circ},5$  auf die Störungen während der Digestion,  $0^{\circ},5$  auf die Bestimmung des Nullpunkts und der Ablesung zu rechnen wäre, bei diesen Versuchen wird als möglich annehmen müssen. Bei

den zur Bestätigung der Formel:  $M = \frac{ma^{\frac{s}{w}}}{w}$  angestellten neunzig

Beobachtungen beträgt aber für  $Z$  die Summe der positiven Differenzen  $+ 21^{\circ},4$ , die der negativen Differenzen  $- 13^{\circ},86$ . Um die Abweichung der Ablesung  $D$  zu finden, muss man noch mit  $(1 + \mu)$  multipliciren, dann ergiebt sich für etwa acht Fälle ein wenig grösserer Fehler als die oben angenommene Grenze

(im Maximum  $2^{\circ},25$ ), und zwar sind dies Fälle, wo die Anwendung einer sehr kleinen Säuremenge und in Folge dessen die Geringfügigkeit der Einwirkung, den relativen Werth einer jeden Ungenauigkeit sehr erhöhen musste. Ueberdies liegt für solche Versuche, bei denen eine grosse Zuckermenge unzersetzt blieb, auch eine erhebliche und unvermeidliche Fehlerquelle in der, während der Ablesung, noch stattfindenden Einwirkung der Säure, welche namentlich von Bedeutung wird, wenn man in Folge ungünstiger atmosphärischer Verhältnisse die Beobachtung auch mit der wünschenswerthen Schnelligkeit ausführen kann.

Bei Betrachtung der Gleichung:

$$\log Z_0 - \log Z = \frac{\frac{s}{m} a^w S T}{w}$$

[504] ergibt sich, dass mit einer proportionalen Veränderung von  $S$  und  $w$  für gleiche  $Z_0$ ,  $m$  und  $T$  auch  $Z$  unverändert, d. h. der Gang der Umwandlung des Zuckers derselbe bleibt; dies bestätigt auch der Versuch, wie sich aus der Zusammenstellung auf Tabelle IX. \*) ergibt. Zugleich ist dies eine Folge der früher nachgewiesenen Unabhängigkeit der Grösse  $M$  von  $Z$ . Wurden nämlich in einer Mischung von beliebigem Zucker-, Säure- und Wasser-Gehalt alle drei Bestandtheile auf das  $n$ -fache vermehrt, so musste offenbar bei unveränderter Temperatur der Gang der Umwandlung unverändert, also auch das Product  $MS$  constant bleiben. Wegen der Unabhängigkeit von  $Z_0$  wird dieser constante Werth von  $MS$  aber auch fortbestehen, wenn man sich  $nZ_0$  wieder auf  $Z_0$  vermindert denkt.

#### D. Einfluss der Temperatur. <sup>6)</sup>

Im Nachstehenden lasse ich nun eine Zusammenstellung bei verschiedenen Temperaturen angestellter Versuche folgen (Tabelle X \*). Es ist leicht begreiflich, dass hier die Unsicherheit der Resultate etwas grösser wird, denn dieselbe Temperatur, oft während langer Zeit, ohne die kleinste Schwankung constant zu erhalten, ist namentlich für Jemand, der ohne Beihülfe arbeitet, nicht immer leicht. Dennoch hoffe ich in dieser Beziehung keinen erheblichen Fehler begangen zu haben; andererseits muss ich mir aber eine Fehlerquelle zum Vorwurf machen, die

\*) Am Schlusse der Abhandlung.



wohl zu vermeiden gewesen wäre. Als ich meine betreffenden Versuche anstellte, kannte ich nämlich noch nicht das Gesetz des Einflusses der Temperatur auf das Drehungsvermögen des Schleimzuckers, es war daher nöthig die Ablesung jedesmal bei derselben Temperatur — ich wählte  $15^\circ$  — vorzunehmen; deshalb musste die Mischung zuvor auf diese Temperatur erwärmt oder abgekühlt werden. Dazu waren immer einige Minuten erforderlich; während dieser, wenngleich nur kurzen Zeit, fand immer eine Nachwirkung statt, die bisweilen nicht unbedeutend sein, aber doch nicht in Rechnung genommen werden konnte. Dazu kam noch, dass [505] ein Theil der Versuche bei sehr hoher äusserer Temperatur ( $20\text{--}22^\circ$ ) angestellt, die bei  $15^\circ$  in den Apparat gebrachte Flüssigkeit durch diesen erwärmt und so einerseits eine ferne Nachwirkung begünstigt, andererseits auch das Ablesungsergebnis verfälscht wurde, indem nun der bei der Berechnung von  $Z$  aus  $D$  angewendete Coëfficient  $\mu$  nicht mehr der entsprechende war. Aus diesem Grunde halte ich namentlich die Versuchsreihen IV. und VI. für unzulässig und die daraus gefundenen Werthe von  $m$  einer etwas höheren Temperatur angehörig; sie sind daher aus der ferneren Berechnung fortzulassen. Behufs dieser Berechnung war aber noch eine Frage experimentell zu beantworten. Ich hatte zwar die Werthe der Constanten  $a$  für die vier Säuren bei mittlerer Temperatur bestimmt; es blieb indess zweifelhaft, ob dieselben der Rechnung für jede höhere oder niedrigere Temperatur zu Grunde gelegt werden könnte. Leider habe ich zu wenig Versuche angestellt, um diese Fragen genügend entscheiden zu können. Folgendes sind die für die beigesetzten Temperaturgrade gefundenen Werthe:

	Salzsäure.	Salpetersäure.	Schwefelsäure.
91,5 $D$	$\lg a = 3,711$		
128,5 $D$		$\lg a = 1,486$	
150 $D$			$\lg a = 1,386$
162 $D$		$\lg a = 1,902$	$\lg a = 1,126$
186,5 $D$	$\lg a = 3,409$		
210 $D$		$\lg a = 1,7257$	
225 $D$			$\lg a = 1,607.$

Diese Werthe sind jederzeit nur aus zwei Versuchen berechnet, was, wie sich aus dem Früheren ergibt, nicht hinreicht, um  $a$  mit Sicherheit zu finden. Da überdies die beiden verglichenen Versuche, mit Ausnahme der bei 225  $D$  angestellten, immer von gleicher Dauer waren, so musste der mit der geringeren Säure-

menge, wegen der Nachwirkung während des AbleSENS stets ein zu grosses  $M$  geben, wodurch dann  $a$  sich immer zu klein berechnete. Dies trat, wie man sieht, auch ein; übrigens ist aber bei [506] Temperaturen ober- und unterhalb  $15^{\circ}$  eine Ab- und Zunahme der Werthe von  $a$  nicht zu bemerken, ich habe mir daher auch gestatten dürfen, die für die mittlere Temperatur gefundenen  $a$  für die ganze Berechnung durchgehend anzuwenden.

Bei letzterer bin ich nun folgendermaassen verfahren. Sucht man mittelst der Formel:

$$lZ_0 - lZ = MST = \frac{\frac{s}{m a^w} \cdot ST}{w}$$

(auf Tabelle XI. am Schluss) das jeder Temperatur zukommende  $m$ , so sieht man bald, dass das Gesetz, welches  $m$  mit der Temperatur verknüpft, für die vier behandelten Säuren dasselbe ist; darnach muss also das Verhältniss zwischen dem  $m$  jeder Temperatur ein constantes sein. Abweichungen sind Ungenauigkeiten der Versuche zuzuschreiben. Um das Verhältniss dieses Factors der mittleren Umwandlungscoefficienten für vier Säuren zu bestimmen, wurde also zunächst dessen Werth für jede der 24 bei verschiedenen Temperaturen angestellten Versuchsreihen berechnet, sodann aus allen diesen Werthen das Mittel genommen. Es ergab sich — für Salzsäure  $m' = m$  Modul. (da wieder briggsche Logarithmen den natürlichen bei der Berechnung substituirt waren) zur Einheit genommen:

für Salzsäure	$m' = 1$	$= P$
für Salpetersäure	$m' = 0,60222$	$= P'$
für Schwefelsäure	$m' = 0,42169$	$= P''$
für Phosphorsäure	$m' = 0,072365$	$= P'''$

Demnach wird also das Gesetz der Abhängigkeit der  $m$  von  $t$  für jede der vier Säuren durch dieselbe Curve ausgedrückt, nur die zugehörigen Parameter sind verschieden. Dividirt man nun die Reihe der  $m'$  für jede Säure durch den entsprechenden Parameter, so erhält man Tabelle XII.

Es kam darauf an, die Form einer Function zu ermitteln, welche das Gesetz der in Rede stehenden Curven ausdrückt, dann mittelst der vorliegenden Versuche die Constanten zu bestimmen. Bei der Wahl der Function liess ich mich durch theoretische Betrachtungen leiten, ein Weg, [507] der mich zwar, wie ich glaube, zum Ziel geführt hat, ohne dass indessen die Werthe

der Constanten, wie sie sich nachher ergaben, mit den Voraussetzungen, von denen ich ausging, vereinbar waren. Die theoretische Bedeutung, welche ich meiner Formel beilegte, ist daher nicht zulässig und die wahre noch zu ermitteln; dennoch will ich den Gang meiner Betrachtungen in der Kürze darlegen, um daran später eine anderweitige Bemerkung zu knüpfen.

Man hat bei dem chemischen Process, von dem hier die Rede ist, offenbar zweierlei zu unterscheiden, einmal die Grösse der Wirksamkeit, der Energie, und das andere Mal die Grösse der dieser Wirksamkeit proportionalen Wirkung, des Effects. Die Wirksamkeit kann gesteigert, aber gleichzeitig der Effect ihrer Einheit vermindert sein, dann wird das Resultat der Wirksamkeit nicht proportional vermehrt, ja es kann sogar bei gesteigerter Wirksamkeit vermindert sein. Es ist sehr wohl denkbar, ja die Annahme vielleicht nicht abzuweisen, dass das Resultat der chemischen Action durch die Temperatur in dieser Weise modificirt werde; während nämlich die Energie der chemisch wirksamen Substanz der Säure durch Temperaturerhöhung eine Steigerung erfährt, muss in Folge der Ausdehnung und der Zunahme der Molekülabstände der, der Wirksamkeits-Einheit entsprechende Effect vermindert werden. Beides muss in der Formel, um welche es sich hier handelt, Berücksichtigung finden. Zu dem Ende glaubte ich mich der aus dem Früheren sich ergebenden Resultate bedienen zu können. Es fand sich dort der Umwandlungs-Coëfficient bei Vermehrung des Lösungsmittels, also das Volumen diesem umgekehrt proportional, andererseits mit einer Exponential-Grösse multiplicirt, deren Exponent der Concentrationsgrad der Säure war. Es war zu versuchen, ob hier die Berechnung mit einer analogen Formel gelingen würde. Ob das Volum durch Hinzufügen des indifferenten Lösungsmittels oder durch Zufuhr von Wärme vermehrt war, musste wohl gleichgültig sein, nur kam es darauf an, das Gesetz zu kennen, nach welchem bei Temperaturerhöhung die Volume zunehmen. Dies Gesetz ist, wie man weiss, noch [508] nicht ermittelt; indess erhält man für die Ausdehnung der Flüssigkeiten eine sehr gute Annäherung, wenn man die Abnahme diesen Temperaturzunahmen proportional setzt, also  $d_0 : d_t = 1 : (1 - \alpha t)$ . Nach diesen Betrachtungen versuchte ich also  $m'$  als Function der Temperatur darzustellen durch die Formel:

$$m' = K\beta^{(t-91,5)} [1 - \alpha(t - 91,5)]$$

worin  $K$ ,  $\beta$  und  $\alpha$  näher zu bestimmende Constante sind.

Zur Bestimmung der Constanten nahm ich die drei Gleichungen:

$$0,1136 = K\beta^{(91,5-91,5)}[1 - \alpha(91,5 - 91,5)]$$

oder:  $0,1136 = K$

$$4,747 = K\beta^{(161,5-91,5)}[1 - \alpha(161,5 - 91,5)]$$

$$164 = K\beta^{(250,5-91,5)}[1 - \alpha(250,5 - 91,5)]$$

theils weil sie die Temperaturscala ungefähr gleichmässig theilen, theils weil sie mir durch die gute Uebereinstimmung oder durch die Anzahl der zugehörigen Versuche am besten beglaubigt schienen. Daraus fand ich:

$$K = 0,1136$$

$$\alpha = 0,0050908 .$$

$$\beta = 1,057788 \quad \log \beta = 0,0243989$$

oder wenn man statt der Scalentheile Centesimalgrade einführt:

$$\alpha' = 0,0154709$$

$$\beta' = 1,186173 .$$

Der Werth für  $\alpha$  war offenbar viel zu gross, um mit meiner theoretischen Ansicht von seiner Bedeutung vereinbar zu sein; wie man daher die Temperaturformel auszulegen habe, muss ich dahingestellt sein lassen, nur will ich eines auffallenden Umstandes erwähnen. Die Formel hat die Eigenschaft bis  $63^{\circ},64$  zu wachsen, dort ihr Maximum zu erreichen, dann plötzlich bei  $64^{\circ},64 = 0$  zu werden und ins Negative überzugehen; damit stimmt auch das Verhalten der Mischung insofern überein, als die Einwirkung augenscheinlich mehr und mehr steigt, bei  $60^{\circ}$  etwa, wie auch *Biot* angiebt, instantan beendigt ist, darüber hinaus in eine, sich durch Bräunung verrathende, Zerstörung [509] des Zuckers übergeht. Sollte diese Uebereinstimmung zufällig sein, oder liegt ihr eine tiefere Bedeutung zu Grunde?

Die mittelst der Formel:

$$m' = P \cdot K [1 - \alpha(t - 91,5)] \beta^{(t-91,5)}$$

und die aus den Beobachtungen mit Hilfe der Gleichung

$$\log Z_0 - \log Z = \frac{\frac{s}{w} m' a^w \cdot S \cdot T}{w}$$

berechneten Werthe finden sich zusammengestellt auf Tabelle XII.

Um indess übersehen zu können, in wie weit Berechnung und Beobachtung übereinstimmen, war es nöthig auf die eine oder andere Art auch  $Z$  zu suchen; dies geschah (auf Tabelle XIII.) aus der Ablesung  $D$  mittelst der gewöhnlichen Formel:  $Z_0 = Z \frac{Z_0 - D}{1 + \mu}$ , und auf dem Wege der Berechnung, aus den hier vollständig folgenden Formeln, für Salzsäure:

$$\log \left( \frac{Z_0}{Z} \right) = K [1 - (t - 91,5) \alpha] \beta^{(t-91,5)} \times (12351)^{\frac{S}{w}} \cdot \frac{S \cdot T}{w}$$

für Salpetersäure:

$$\log \left( \frac{Z_0}{Z} \right) = 0,60222 K \beta^{(t-91,5)} \times [1 - (t - 91,5) \alpha] \\ \times (664,1)^{\frac{S}{w}} \frac{S \cdot T}{w}$$

für Schwefelsäure:

$$\log \left( \frac{Z_0}{Z} \right) = 0,42169 \cdot K [1 - (t - 91,5) \alpha] \beta^{(t-91,5)} \\ \times (167,6)^{\frac{S}{w}} \frac{S \cdot T}{w}$$

für Phosphorsäure:

$$\log \left( \frac{Z_0}{Z} \right) = 0,072365 \cdot K [1 - (t - 91,5) \alpha] \beta^{(t-91,5)} \\ \times (2,603)^{\frac{S}{w}} \frac{S \cdot T}{w}$$

worin  $K$ ,  $\alpha$  und  $\beta$  die vorerwähnten Werthe haben. Um die wahren  $m$  aus  $m' = m$  Modul. zu finden, hat man nur nöthig, statt mit  $K$  mit  $\frac{K}{\text{Modul.}} = \frac{0,1136}{0,4342945} = 0,2615737$  zu multipliciren.

[510] Setzt man  $\frac{S}{w} = q$  und führt Centesimalgrade ein, so erhält man zur Berechnung von  $Z$  die allgemeine Formel:

$$Z = Z_0 e^{-C(1 - \alpha' t) \beta^{t \alpha^2} \cdot q \cdot T}$$

Addirt man endlich noch die positiven und negativen Differenzen zwischen Beobachtung und Berechnung, so ergibt sich für die berechneten 72 Versuche

Summe der positiven Differenzen =  $26^{\circ},78$

Summe der negativen Differenzen =  $22^{\circ}$ .

7) Nach Aufführung meiner Versuchsergebnisse habe ich nur noch Weniges hinzuzufügen. Ich muss es den Chemikern überlassen, wenn diese anders meiner Arbeit einige Aufmerksamkeit schenken, zu entscheiden, ob und wie weit die gefundenen Formeln auf andere chemische Vorgänge Anwendung finden; jedenfalls scheinen mir doch alle diejenigen, deren Eintreten man der Wirksamkeit einer katalytischen Kraft zuschreibt, hierher zu gehören. Abzuleiten, welche theoretische Folgerungen sich aus der Form der Gleichung für  $m$  ergeben, ist, wie ich glaube, die Aufgabe der Molecular-Physik in ihrem mathematischen Theil; andeuten möchte ich nur, dass sich daraus vielleicht eine Abhängigkeit der chemischen Kraftwirkung von der Entfernung und zwar, da  $w$  proportional  $r^3$ , — wenn  $r$  den Abstand zwischen Säure und Zuckermolekül bedeutet — eine Abnahme proportional der dritten Potenz dieses Abstandes ergibt. Dabei muss man dann freilich noch die Annahme machen, dass der Factor  $a^q$ , welcher sich ebenfalls mit  $w$  verändert, sich nur auf die Energie des wirksamen Moleküls, nicht auf den durch die Einheit der Energie hervorgebrachten Effect beziehen. Welche Bedeutung hat aber jene Exponentialgrösse  $a^q$ ? Wirken etwa die Säuremoleküle, gleichsam inducirend, sich gegenseitig zu einer energischeren chemischen Action steigernd auf einander?

Ob auch der Luftdruck von Einfluss auf den hier besprochenen chemischen Process sei, habe ich bis jetzt noch nicht untersuchen können, ich werde meine Ansicht demnächst in dieser Beziehung vervollständigen.

[511]

Tabelle V. Salzsäure  $\log a = 4,09170$ .

I. Säure und Lösungsmittel veränderlich.				$\frac{s}{M} = \frac{maw}{m} = 2,118$ .		Z.		
Z <sub>0</sub>	S.	w.	T.	D.	Beobachtet.	Berechnet.	Differenz.	
180,75	4 × 0,242 g	6 g	30'	- 20	8,7373	9,707	30,69	30,08
"	3 × 0,242	"	"	+ 2,5	7,1124	6,788	6,95	7,27
"	2 × 0,242	"	1h	+ 4,25	4,4323	4,384	8,22	8,27
"	0,242	"	"	+ 12,25	3,1174	3,099	14,03	14,05
"	4 × 0,242	10	"	+ 0,25	5,6401	5,279	5,32	5,77
"	3 × 0,242	"	"	+ 5	4,5392	4,202	8,78	9,28
"	2 × 0,242	"	2h 10'	+ 5,75	3,232	3,344	8,58	8,34
"	0,242	"	1h 36'	+ 13,5	2,513	2,661	14,98	14,78

IV. Lösungsmittel veränderlich  $m = 1,579$ .

200	2 × 0,242 g	4 g	2h	- 50,25	4,4166	4,945	10,7	10,27	- 0,43
"	"	6	2h 30'	- 2	3,4282	3,380	4,06	4,29	+ 0,23
"	"	8	3h	+ 0,75	2,8563	2,795	6,05	6,78	+ 0,73
"	"	10	"	+ 40	2,5869	2,493	8,41	8,68	+ 0,27
"	"	12	"	+ 6,5	2,4058	2,310	10,22	9,97	+ 0,25

Temperatur der Digestion und Ablesung  $t = 16^{\circ},5$ .

[512]

Tabelle V. Salzsäure.

II. Säuremenge veränderlich.		$M = \frac{maw}{m} = 1,521.$				Z.		
Z <sub>0</sub>	S.	w.	T.	D.	Beobachtet.	Berechnet.	Differenz.	
390	4 × 0,202g	9,612g	2h	00	3,301	3,359	100,49	- 00,37
"	3,5 × 0,202	9,679	2h	5	2,949	3,025	14,11	- 0,36
"	3 × 0,202	9,746	"	8,5	2,901	2,733	17,82	+ 0,83
"	2,5 × 0,202	9,813	3h	7,75	2,426	2,471	16,19	- 0,26
"	2 × 0,202	9,880	"	13,5	2,2574	2,236	20,74	+ 0,13
"	1,5 × 0,202	9,947	5h 30'	9,5	2,045	2,027	17,84	+ 0,12
"	1 × 0,202	10,014	"	19	1,809	1,840	24,38	- 0,19
"	0,101	10,081	"	27,25	1,936	1,671	31,56	+ 1,04
III. Säuremenge veränderlich m = 1,681.								
290,25	6 × 0,2424	8,158g	1h	90,75	8,302	9,008	00,73	- 00,24
"	5,5 × "	"	"	9,25	8,217	7,832	2,09	+ 0,76
"	5 × "	"	"	7,75	7,288	6,809	2,851	+ 0,43
"	4,5 × "	"	"	5,25	6,275	5,920	4,734	+ 0,50
"	4 × "	"	2h	8,25	4,850	5,147	2,08	+ 0,02
"	3,5 × "	"	"	6,25	4,429	4,460	3,94	+ 0,43
"	3 × "	"	"	3	3,914	3,886	5,94	+ 0,07
"	2,5 × "	"	4h	7	3,217	3,375	2,92	+ 0,05
"	2 × "	"	"	3	2,935	2,936	5,87	+ 0,00
"	1,5 × "	"	"	3,5	2,478	2,553	10,26	- 0,32
"	1 × "	"	8h	1	2,202	2,222	8,77	- 0,29
"	0,5 × "	"	"	12	2,040	1,932	17,24	+ 0,50
"	0,25 × "	"	"	19	2,143	1,802	22,86	+ 1,14



[513]

Tabelle VI. Salpetersäure  $\log a = 2,8222$ .

I. Säure- und Lösungsmittel veränderlich.		$M = m \frac{a^w}{m} = 0,0995$ .				Z.		
Z <sub>0</sub>	S.	w.	T.	D.	Beobachtet.	Berechnet.	Differenz.	
180,75	4. 0,277	6g	1h 5'	00,5	2,906	3,274	40,94	- 00,77
"	3. "	"	"	+ 5	2,168	2,428	8,89	- 0,78
"	2. "	"	1h	+ 10	1,9216	1,801	12,48	+ 0,32
"	1. "	"	3h 15'	+ 9	1,357	1,336	11,76	+ 0,07
"	1. "	5g	"	+ 7,75	1,318	1,420	10,86	- 0,70
"	5. "	10g	1h 5'	+ 4	2,405	2,428	8,17	- 0,06
"	4. "	"	2h	+ 0,5	2,347	2,035	5,66	- 0,98
"	3. "	"	1h	+ 11	1,838	1,700	13,19	+ 0,35
"	2. "	"	3h 15'	+ 7,5	1,358	1,420	10,68	- 0,52
"	1. "	"	"	+ 12,75	1,257	1,186	14,45	+ 0,21
II. Säuremenge veränderlich $m = 0,9905$ .								
360	4. 0,281	8,091g	2h	20	2,197	2,176	80,84	+ 00,12
"	3,5. "	"	"	+ 2,5	1,952	1,934	12,08	+ 0,12
"	3. "	"	"	+ 7	1,789	1,772	15,27	+ 0,12
"	2,5. "	"	"	+ 11,75	1,644	1,628	18,67	+ 0,12
"	2. "	"	4h	+ 6	1,416	1,403	14,56	+ 0,12
"	1,5. "	"	"	+ 13,25	1,253	1,241	19,74	+ 0,11
"	1. "	"	4h	+ 20,5	1,151	1,140	24,92	+ 0,08
"	0,5. "	"	"	+ 27,75	1,120	1,109	30,1	+ 0,05

[514]

Tabelle VI. Salpetersäure.

III. Säuremenge veränderlich.				$M = \frac{maw}{m} = 1,373.$		Z.	
Z.	S.	w.	T.	D.	Beobachtet.	Berechnet.	Differenz.
380	6.0,277g	10g	1h	—	3,7746	4,144	89,84
"	5,5.	"	"	+	3,581	3,779	10,85
"	5.	"	"	+	3,484	3,447	10,12
"	4,5.	"	"	+	3,263	3,144	12,66
"	4.	9g	"	+	3,213	3,057	15,41
"	3,5.	"	"	+	2,731	2,706	15,97
"	3.	"	2h 5'	+	2,541	2,502	19,29
"	2,5.	"	2h	+	2,315	2,264	12,32
"	2.	"	1h 40'	+	1,921	2,048	16,72
"	1,5.	"	5h	+	1,857	1,853	24,13
"	1.	"	"	+	1,781	1,676	14,16
"	0,5.	"	25,5	+	1,558	1,517	20,21
"		"					28,83
							70,78
							10,12
							12,66
							15,41
							15,97
							19,13
							12,28
							17,03
							24,58
							14,18
							20,97
							29,04

Temperatur der Ablesung 22<sup>o</sup>,5.

Tabelle VII. Schwefelsäure  $\log a = 2,2243$ .

[515]

I. Säure- und Lösungsmittel veränderlich.		$\frac{S}{m}$		Z.			
$Z_0$	S	w.	T.	D.	Beobachtet.	Berechnet.	Differenz.
280,13	4. 0,78g	6g	30'	- 110,5	9,212	11,12	0 <sup>0</sup> ,13
»	3. »	»	»	- 7,75	5,222	5,722	2,7
»	2. »	»	1 <sup>h</sup>	- 3,5	4,242	3,838	6,13
»	1. »	»	»	+ 13	2,643	2,573	12,46
»	4. »	10g	30'	- 3	3,014	2,940	5,78
»	3. »	»	»	+ 6	1,677	1,726	8,43
»	2. »	»	2 <sup>h</sup>	+ 0,25	1,597	1,511	17,44
»	1. »	»	»	+ 13,5	1,282	1,158	17,79
							0 <sup>0</sup> ,04
							2,16
							7,09
							14,06
							4,84
							8,14
							17,9
							18,56
							- 0 <sup>0</sup> ,09
							- 0,54
							+ 0,96
							+ 1,6
							- 0,94
							- 0,29
							+ 0,46
							+ 0,77
II. Säuremenge veränderlich, $m = 0,8508$ . (Ablesung bei 190 und 200°).							
380	4,5 . 0,78g	8g	30'	- 130,5	6,836	8,067	10,21
»	4. »	»	»	- 11,5	5,939	6,283	2,64
»	3,5 . »	»	»	- 8,5	5,271	4,894	4,79
»	3. »	»	»	- 0,5	3,819	3,811	10,5
»	2. »	»	2 <sup>h</sup>	- 7,5	2,153	2,312	5,5
»	1,5 . »	»	»	+ 1,5	1,720	1,801	11,93
»	1. »	»	4 <sup>h</sup>	0	1,359	1,403	10,86
»	0,5 . »	»	»	+ 16	1,188	1,092	22,29
»	0,25 . »	»	»	+ 25,75	1,166	0,964	29,25
							0 <sup>0</sup> ,65
							2,26
							5,56
							10,52
							4,77
							11,3
							- 0,63
							- 0,08
							+ 0,98
							+ 0,35

Tabelle VIII. Phosphorsäure  $\log a = 0,41551$ . [516]

I. Säuremenge veränderlich. (Ablesung bei 21 <sup>o</sup> ,5.)					$M = \frac{m a^w}{w}$ $m = 0,1752$ .				Z.	
$Z_0$	S.	w.	T.	D.	Beobachtet.	Berechnet.	Beobachtet.	Berechnet.	Differenz	
36 <sup>o</sup> ,5	6. 0,2955g	10g	9h	+ 9 <sup>o</sup> ,25	0,2043	0,2076	17 <sup>o</sup> ,23	17 <sup>o</sup> ,02	- 0 <sup>o</sup> ,21	
"	5. " "	"	"	+ 12,5	0,2039	0,2018	19,53	19,66	+ 0,13	
"	4. " "	9g	"	+ 15	0,1979	0,1987	21,3	21,25	- 0,05	
"	3. " "	"	"	+ 19,5	0,1957	0,1925	24,48	24,64	+ 0,16	
"	2. " "	8g	"	+ 23,75	0,1854	0,1881	27,48	27,38	- 0,10	
"	1. " "	"	"	+ 29,75	0,1829	0,1815	31,73	31,76	+ 0,03	
II. Säuremenge veränderlich. (Ablesung bei 22 <sup>o</sup> ) $m = 0,17103$ .										
36 <sup>o</sup> ,5	6. 0,2955	10,146g	11h	+ 6 <sup>o</sup>	0,20245	0,20215	140,9	140,92	+ 0 <sup>o</sup> ,02	
"	4,5. " "	"	"	+ 12	0,19403	0,19387	19,17	19,18	+ 0,01	
"	3. " "	"	"	+ 18	0,2009	0,18593	23,4	24,19	+ 0,79	

[517]

Tabelle IX.

Säure und Lösungsmittel proportional veränderlich:  
a) Salzsäure.

Z <sub>0</sub> .	S.	w.	T.	D.	$M = \frac{S}{m a^w}$
190	0,5 · 0,242g	3g	4h 30'	30,5	2,145
"	1. "	6	"	3	2,259
"	1,5. "	9	"	3	2,259
"	2. "	12	"	3,5	2,145
b) Schwefelsäure.					
170,5	2 · 0,78g	12g	2h 30'	— 00,5	1,743
"	1,5. "	9	"	+ 0,5	1,393
"	1. "	6	"	+ 1	1,471
"	0,5. "	3	"	+ 2	1,317
c) Salpetersäure.					
190,5	0,5 · 0,281g	2,768g	8h	+ 30	1,0575
"	0,75. "	4,152	"	+ 2	1,1676
"	1. "	5,536	"	+ 2	1,1676
"	1,5. "	8,304	"	+ 2	1,1676
36	2,5. "	8,012	6	— 6,75	1,560
27	2. "	6,410	"	— 5,5	1,625
18	1,5. "	4,807	"	— 4	1,705
9	1. "	3,205	"	— 2	1,705

Tabelle X.

[518]

Name d. Säure.	Z <sub>0</sub> .	S.	w.	T.	D.	Name d. Säure.	Z <sub>0</sub> .	S.	w.	T.	D.
I. Versuchsreihe. Temperatur d. Digestion = 91,5 D. Temperatur d. Ablesung = 150 C.											
Salzsäure	380	0,521g	8130	13h 20'	+ 190,5	Salzsäure	390	0,677g	9,700g	17h	140,5
"	"	0,261	8130	13h 20'	+ 30	Salpetersäure	"	1,005	9,520	"	15,75
Salpetersäure	"	0,859	"	"	+ 20	Schwefelsäure	"	1,560	9,370	"	11,5
Schwefelsäure	"	1	"	"	+ 22,5	Phosphorsäure	"	1,389	9,380	"	34,75
II. Versuchsreihe. Temperatur d. Digestion = 91,5 D. Temperatur d. Ablesung = 150 C.											
III. Versuchsreihe. Temperatur d. Digestion = 91,5 D. Temperatur d. Ablesung = 150 C.											
Salzsäure	370,25	0,677g	9,860	7h 30'	260,25	Salzsäure	380	0,521g	8130	2h 45'	280,5
Salpetersäure	"	1,005	9,683	"	27,75	Salpetersäure	"	0,859	"	"	270,5
Schwefelsäure	"	1,560	9,531	"	22,75	Schwefelsäure	"	1	"	"	29
Phosphorsäure	"	1,389	9,540	"	34,75						
IV. Versuchsreihe. Temperatur d. Digestion = 103 D. Temperatur d. Ablesung = 150 C.											
V. Versuchsreihe. Temperatur d. Digestion = 106 D. Temperatur d. Ablesung = 150 C.											
Salzsäure	390	0,677g	9,700	9h 25'	+ 110	Salzsäure	380	0,521g	8g	2h	250,5
Salpetersäure	"	1,005	9,520	9h 40'	+ 12	Salpetersäure	"	0,859	"	"	25
Schwefelsäure	"	1,560	9,370	"	+ 6,5	Schwefelsäure	"	1	"	"	26
Phosphorsäure	"	1,389	9,380	"	+ 32						
VI. Versuchsreihe. Temperatur d. Digestion = 116 D. Temperatur d. Ablesung = 150 C.											

[519]

VII. Versuchsreihe. Temperatur d. Digestion = 120,5 D.  
Temperatur d. Ablesung = 150 C.

VIII. Versuchsreihe. Temperatur d. Digestion = 128,5 D.  
Temperatur d. Ablesung = 150 C.

Name d. Säure.	Z <sub>0</sub> .	S.	w.	T.	D.	Name d. Säure.	Z <sub>0</sub> .	S.	w.	T.	D.
Salzsäure	370,25	0,3386	10,08	12h	+ 12 <sup>0</sup>	Salzsäure	390	0,521g	8g	12h 30'	- 10 <sup>0</sup> ,
Salpetersäure	"	0,5025	10	"	+ 14,25	Salpetersäure	"	0,859	"	"	- 5,75
Schwefelsäure	"	0,78	9,920	"	+ 9,25	"	"	0,430	"	"	+ 11
Phosphorsäure	"	1,389	9,540	"	29	Schwefelsäure	"	1,0	"	"	- 9,5

IX. Versuchsreihe. Temperatur d. Digestion = 136 D.  
Temperatur d. Ablesung = 150 C.

X. Versuchsreihe. Temperatur d. Digestion = 136,5 D.  
Temperatur d. Ablesung = 150 C.

Salzsäure	370,25	0,677g	9,860	4h 35'	- 30	Salzsäure	390	0,3386g	9,921g	7h	+ 90,5
Salpetersäure	"	1,005	9,683	"	- 2,5	Salpetersäure	"	0,5025	9,833	"	+ 8,
Schwefelsäure	"	1,560	9,531	"	- 7	Schwefelsäure	"	0,78	9,757	"	+ 3,5
Phosphorsäure	"	1,389	9,540	"	+ 30	Phosphorsäure	"	1,389	9,377	"	+ 27,5

XI. Versuchsreihe. Temperatur d. Digestion = 144 D.  
Temperatur d. Ablesung = 180,5 C.

XII. Versuchsreihe. Temperatur d. Digestion = 155 D.  
Temperatur d. Ablesung = 150 C.

Salzsäure	380	0,520g	8g	5h	- 80,5	Salzsäure	370,5	0,521g	8g	2h	- 0 <sup>0</sup> ,5
Salpetersäure	"	0,859	"	"	- 9,5	Salpetersäure	"	0,859	"	"	- 0,5
Schwefelsäure	"	1	"	"	- 7,5	Schwefelsäure	"	1	"	"	+ 3,
Phosphorsäure	"	1,182	"	"	+ 27	"	"	0,5	"	"	+ 19,

[520]

XIII. Versuchsreihe. Temperatur d. Digestion = 151 D.  
Temperatur d. Ablesung = 150 C.

XIV. Versuchsreihe. Temperatur d. Digestion = 162 D.  
Temperatur d. Ablesung = 150 C.

Name d. Säure.	Z <sub>0</sub> .	S.	w.	T.	D.	Name d. Säure.	Z <sub>0</sub> .	S.	w.	T.	D.
Salzsäure	390	0,339g	9,921g	2h	160,75	Salzsäure	37,05	0,521g	9g	2h	70,25
Salpetersäure	"	0,503	9,833	"	18	Salpetersäure	"	0,859	"	"	7,75
Schwefelsäure	"	0,78	9,757	"	15,25	"	"	0,43	"	"	8,5
						Schwefelsäure	"	1	"	"	4
						"	"	0,5	"	"	12

XV. Versuchsreihe. Temperatur d. Digestion = 166,5 D.  
Temperatur d. Ablesung = 150 C.

XVI. Versuchsreihe. Temperatur d. Digestion = 182 D.  
Temperatur d. Ablesung = 150 C.

Salzsäure	390	0,339g	9,921g	2h	+ 40,25	Salzsäure	390	0,339g	9,921g	1h	+ 30
Salpetersäure	"	0,503	9,833	"	+ 6	Salpetersäure	"	0,503	9,833	"	+ 3,75
Schwefelsäure	"	0,78	9,757	"	+ 1,75	Schwefelsäure	"	0,78	9,757	"	- 1,25
Phosphorsäure	"	1,389	9,377	"	+ 25,5	Phosphorsäure	"	1,389	9,377	"	+ 26

XVII. Versuchsreihe. Temperatur d. Digestion = 186,5 D.  
Temperatur d. Ablesung = 150 C.

XVIII. Versuchsreihe. Temperatur d. Digestion = 195 D.  
Temperatur d. Ablesung = 150 C.

Salzsäure	370,5	0,521g	8g	1h	- 120	Salzsäure	370,5	0,521g	9g	30'	- 80,25
Salpetersäure	"	0,859	"	"	- 11,25	Salpetersäure	"	0,859	"	"	- 9,5
Salzsäure	"	0,26	"	"	+ 1,25	Schwefelsäure	"	1	"	"	- 6
Schwefelsäure	"	1	"	"	- 11,25						



[521]

XIX. Versuchsreihe. Temperatur d. Digestion = 197 D.  
Temperatur d. Ablesung = 150 C.

Name d. Säure.	Z <sub>0</sub> .	S.	w.	T.	D.	Name d. Säure.	Z <sub>0</sub> .	S.	w.	T.	D.
Salzsäure	390	0,339g	9,921g	30'	+ 30,25	Salzsäure	370,5	0,521g	9g	15'	- 80
Salpetersäure	"	0,503	9,833	"	+ 5	Salpetersäure	"	0,859	"	"	- 9,25
Schwefelsäure	"	0,78	9,757	"	+ 1,25	"	"	0,43	"	"	+ 6
Phosphorsäure	"	0,389	9,377	"	+ 25,75	Schwefelsäure	"	1	"	"	- 5,75

XX. Versuchsreihe. Temperatur d. Digestion = 210 D.  
Temperatur d. Ablesung = 150 C.

XXI. Versuchsreihe. Temperatur d. Digestion = 212 D.  
Temperatur d. Ablesung = 150 C.

Salzsäure	390	0,339g	9,921g	30'	- 60,25	Salzsäure	370,5	0,521g	9g	12'	- 120
Salpetersäure	"	0,503	9,833	"	- 6,25	Salpetersäure	"	0,859	"	15	- 11,5
Schwefelsäure	"	0,782	9,757	"	- 7,75	Schwefelsäure	"	1	"	12	- 10
Phosphorsäure	"	1,389	9,377	"	- 17,75	"	"	0,5	"	24	- 7

XXII. Versuchsreihe. Temperatur d. Digestion = 225 D.  
Temperatur d. Ablesung = 150 C.

XXIII. Versuchsreihe. Temperatur d. Digestion = 226 D.  
Temperatur d. Ablesung = 15 C.

Salpetersäure	390	0,252g	9,99g	30'	- 20,5	Salzsäure	370,5	0,261g	9g	10'	- 9,75
Schwefelsäure	"	0,39	9,952	"	- 4	Salpetersäure	"	0,43	"	12	- 12,25
Phosphorsäure	"	0,695	9,762	"	- 20	Schwefelsäure	"	0,5	"	10	- 7,75

XXIV. Versuchsreihe. Temperatur d. Digestion = 250,5 D.  
Temperatur d. Ablesung = 150 C.

[522]

Tabelle XI.

Werthe von  $m' = m$  Modul. Berechnet aus:  $\log Z_0 - \log Z = \frac{m' \cdot a^w \cdot ST}{w}$ .

Scalentheile des Thermometers.	Salzsäure.	Salpetersäure.	Schwefelsäure.	Phosphorsäure.
91,5	{ 0,11397 0,1219 a) 0,1253 b) 0,10588 0,26806 0,2483 0,4902 0,5275 0,6836 1,094 1,040 1,618 2,3768 2,4445 4,2744 4,744 10,123 10,990 a) 11,571 b) }	0,06747 0,065024 0,05699 0,1657 0,1463 0,2822 0,3026 { 0,28772 a) 0,34088 b) } 0,77611 0,7315 0,9451 1,294 1,4814 { 2,4262 a) 2,6842 b) } 2,831 6,3302 5,332	0,04459 0,04782 0,04875 0,12447 0,1009 0,2294 0,2307 0,30186 0,4483 0,5244 0,6975 { 0,950 a) 1,0718 b) } 1,0068 1,6586 a) 1,9085 b) 2 4,6466 4,457	0,01164 0,01635 0,03473 0,03585 0,08165 0,08263 0,1154 0,17103 0,1752 0,3473 0,6647

[523]

Werthe von  $m' = m$  Modul. Berechnet aus:  $\log Z_0 - \log Z = \frac{m' \cdot a \cdot w \cdot S \cdot T}{v}$ .

Scalentheile des Thermometers.	Salzsäure.	Salpetersäure.	Schwefelsäure.	Phosphorsäure.
195	18,404	11,086	7,447	
197	20,071	11,899	8,013	1,3603
210	32,762	{ 21,72 a)	14,675	
212	33,619	{ 24,50 b)	13,273	2,3994
225	65,94	21,632	{ 24,30	
226		26,66	{ 26,30	4,671
250,5	163,93	41,909	26,927	
		98,886	66,175	

Tabelle XII.

Abtheilungen der Scala.	Centesimalgrade.	$m' \bar{P}$ Salzsäure $P = 1.$	$m' \bar{P}$ Salpetersäure $P' = 0,60222.$	$m' \bar{P}''$ Schwefelsäure $P'' = 0,42169.$	$m' \bar{P}'''$ Phosphorsäure $P''' = 0,072369.$	Berechnet nach der Formel: $m' = K [1 - \alpha(t - 91,5)] \beta(t - 91,5)$ $\alpha = 0,0050909.$ $\beta = 1,057788.$
91,5	00	{ 0,1219 a) 0,1253 b)	0,11204	0,11561		
103	30,78	{ 0,1059 0,11399 0,26806	0,10797 0,09463 0,26515	0,11340 0,10574 0,29517		0,1136

[524]

Abtheilungen der Scala.	Centesimalgrade.	$\frac{m'}{P}$ Salzsäure $P = 1.$	$\frac{m'}{P}$ Salpetersäure $P = 0,60222.$	$\frac{m''}{P''}$ Schwefelsäure $P'' = 0,42169.$	$\frac{m'''}{P'''}PhosphorsäureP''' = 0,072365.$	Berechnet nach der Formel: $m' = K[1 - \alpha(t - 91,5)]\beta(t - 91,5)$ $\alpha = 0,0050908$ $\beta = 1,057788.$
106	40,77	0,2483	0,24293	0,23928		0,2376
116	8,06	0,3902	0,4686	0,54440		0,4938
120,5	9,54	0,5275	0,50247	0,57708	0,49541	0,7371
128,5	12,17	0,6836	0,56604	0,71581	1,1283	1,0704
136	14,64	1,094	1,2887	1,0631	1,1418	1,0973
136,5	14,81	1,040	1,2147	1,2436	1,5947	1,5895
144	17,27	1,618	1,5694	1,6541	2,3634	2,1339
150	19,25	2,3768	2,1489	2,2529 a)	2,421	2,2408
151	19,57	2,4445	2,4599	2,5417 b)		
162	23,19	4,2744	{ 4,0288 a) 4,4572 b)	2,3875		
166,5	24,68	4,744	{ 4,7006 10,512	3,933 a)		3,8232
182	29,78	10,123	4,7006	4,5257 b)		4,747
186,5	31,26	{ 10,99 a) 11,57 b)	8,8549	4,7428	4,7992	9,8922
195	34,06	18,404	18,408	11,019	9,1854	12,197
197	34,71	20,071	19,759	10,569		18,018
210	39	32,762	{ 36,067 a) 40,683 b)	19,002	18,798	19,723
212	39,65	33,619	35,917	34,801		35,09
225	43,92	65,94		{ 31,476 57,625 a)	33,157	38,253
226	44,26		68,586	{ 62,368 b) 63,855		65,812
250,5	51,99	163,93	164,20	156,93	64,548	68,510 164,00

Tabelle XIII.

[525]

Säulentherr- Thermom.	Salzsäure Z.			Salpetersäure Z.			Schwefelsäure Z.			Phosphorsäure Z.		
	Beobacht.	Berechn.	Differenz.	Beobacht.	Berechn.	Differenz.	Beobacht.	Berechn.	Differenz.	Beobacht.	Berechn.	Differenz.
91,5	{ 240,65	250,39	+ 0,74	250,13	250,75	+ 0,62	270,12	270,11	- 0,01	310,55	310,03	- 0,52
106	{ 32,23	32,73	+ 0,5	19,7	20,23	+ 0,53	16,20	16,29	+ 0,09			
120,5	{ 18,80	19,40	+ 0,6	20,81	19,76	- 1,05	17,6	17,6	+ 0			
128,5	{ 19,03	18,70	- 0,33	18,99	15,31	- 3,68	4,97	4,66	- 0,31			
136	{ 3,65	3,03	- 0,62	8,84	9,00	+ 0,16	6,2	5,85	- 0,35			
136,5	{ 8,21	8,17	- 0,04	16,84	18,27	+ 1,43	14,09	15,85	+ 1,76			
144	{ 17,72	16,96	- 0,76	3,63	3,51	- 0,12	5,66	6,10	+ 0,44			
150	{ 4,06	4,22	+ 0,16	10,34	10,45	+ 0,11	{ 24,52	26,25	+ 1,73			
151	{ 10,08	11,53	+ 1,45	23,99	25,03	+ 1,04	{ 13,46	14,04	+ 0,58			
162	{ 22,95	23,99	+ 1,04	{ 8,38	9,36	+ 0,98	{ 22,34	23,09	+ 0,75			
166,5	{ 5,22	6,43	+ 1,21	{ 19,6	21,68	+ 2,08	{ 5,16	5,71	+ 0,55			
182	{ 13,93	13,93	+ 0	15,41	15,27	+ 0,14	{ 16,77	18,76	+ 1,99			
186,5	{ 13,03	13,36	+ 0,33	13,81	14,68	+ 0,87	{ 12,86	12,85	- 0,01			
	{ 1,79	1,28	- 0,49				{ 10,75	12,24	+ 1,49			
	{ 11,35	10,85	- 0,5				{ 3,29	2,21	- 1,08			
										29,69	29,78	+ 0,09
										30,04	29,44	- 0,6

[526]

Zerlegung des Thermo-	Salzsäure Z.			Salpetersäure Z.			Schwefelsäure Z.			Phosphorsäure Z.		
	Beobacht.	Berechn.	Differenz.	Beobacht.	Berechn.	Differenz.	Beobacht.	Berechn.	Differenz.	Beobacht.	Berechn.	Differenz.
	195	40,49	40,69	+ 0,2	30,91	40,1	+ 0,19	70,15	60,74	- 0,41	290,86	290,47
197	13,21	13,46	+ 0,25	14,7	14,61	- 0,09	12,51	12,30	- 0,21			
210	5,39	4,96	- 0,43	{ 4,08	4,28	+ 0,2	7,15	7,05	- 0,1			
212	6,3	4,94	- 1,36	{ 14,98	16,02	+ 1,94	6,19	4,17	- 2,02	24,35	22,65	- 1,7
225	1,79	1,80	+ 0,01	{ 6,6	5,9	- 0,7	{ 4,17	3,05	- 1,12	25,9	25,26	- 0,64
226				9,34	9,55	+ 0,21	8,82	7,92	- 0,9			
250,5	3,41	3,41	+ 0	1,94	1,95	+ 0,01	5,75	5,28	- 0,47			

## Anmerkungen.

---

Die Abhandlung von *Ludwig Wilhelmy*: »Ueber das Gesetz, nach welchem die Einwirkung der Säuren auf den Rohrzucker stattfindet« ist in *Poggendorff's Annalen*, Bd. LXXXI, Seite 413—433 und 499—526 1850 veröffentlicht worden. Ihre Bedeutung liegt darin, dass sie den ersten gelungenen Versuch enthält, in die Gesetze einzudringen, nach welchen chemische Vorgänge in der Zeit ablaufen. An einem Beispiel, welches für die ganze spätere Entwicklung der Sache maassgebend geblieben ist, der Inversion des Rohrzuckers, zeigt der Verfasser die strenge numerische Gültigkeit seiner aus allgemeinen Betrachtungen abgeleiteten Formel, und eröffnet damit den ersten Ausblick auf die Möglichkeit, überhaupt den Verlauf chemischer Reactionen in der Zeit der Rechnung zu unterwerfen. Freilich ist diese Anregung zunächst ganz ohne Folge geblieben; die bahnbrechende Arbeit ist von den späteren Forschern, welche in dieses Gebiet selbständig einzudringen sich bemüht hatten, nicht erwähnt, also wahrscheinlich auch nicht bemerkt worden, bis der Herausgeber dieses Neudruckes auf dieselbe und ihre grundlegende Beschaffenheit die Aufmerksamkeit der Fachgenossen zu lenken sich bemüht hat. (*Journ. f. pr. Ch.* (2). XXIX, 385, 1884 und *Lehrb. der allgem. Chemie* II, 616.)

Durch den Umstand, dass die Bedeutung der vorliegenden Arbeit so lange übersehen wurde, ist über die Persönlichkeit ihres Verfassers in weiteren Kreisen nichts bekannt. Der Freundschaft eines nahen Freundes des im Jahre 1864 Verstorbenen, Prof. *J. Quincke* in Heidelberg, verdanke ich einige Nachrichten über seinen Lebensgang, die ich zusammen mit dem von gleicher Hand herrührenden Verzeichnis der wissenschaftlichen Abhandlungen *Wilhelmy's* im Anhange folgen lasse.

1) In dieser Annahme hat *Wilhelmy* vollkommen Recht gehabt. Es hat sich erwiesen, dass sämtliche chemischen Vorgänge, bei welchen die Aenderung der Menge nur für einen

einzigem Stoff in Frage kommt, nach demselben Gesetz ablaufen, so dass die für die Inversion des Rohrzuckers aufgestellte und erwiesene Beziehung allgemeine Geltung hat.

2) Die Versuche mit Essigsäure sind offenbar nicht lange genug fortgesetzt worden. Gegenwärtig wissen wir, dass sämtliche Säuren, auch die Essigsäure, die Inversion hervorbringen. Die Geschwindigkeit derselben ist zwar um so geringer, je »schwächer« die Säure ist, doch behält sie auch bei der ziemlich schwachen Essigsäure eine deutlich messbare Grösse.

3) In dieser Definition findet sich eine Unklarheit.  $M$  ist die Grösse, welche gegenwärtig der Coefficient der Geschwindigkeit der chemischen Reaction, oder kürzer der Geschwindigkeitscoefficient genannt wird. Seiner Bedeutung nach stellt er das Verhältniss zwischen der im Zeitelement  $dZ$  umgewandelten Zuckermenge zu der Dauer dieses Zeitelements  $dT$  dar, wenn die wirksame Menge der Säure  $S$  und des Zuckers  $Z$  beide den Werth Eins haben. Somit ist auch die S. 8 befindliche Bemerkung, dass in den erhaltenen endlichen Werthen noch ein unendlich grosser Factor enthalten sei, entsprechend abzuändern.

4) Diese Ergebnisse sind zum Theil durch spätere Forschungen bestätigt und erweitert, zum Theil auch zurechtgestellt worden. Das Kleinerwerden der Linksdrehung des invertirten Zuckers, die Reversion, wurde in neuerer Zeit eingehend von *A. Wohl* (Ber. d. d. chem. Ges. XXIII, 2084. 1890) untersucht; die von *Wilhelmy* beobachteten grossen Unterschiede des »Umkehrungscoefficienten« für verschiedene Säuren sind indessen durch Versuchsfehler veranlasst. Ueber den Einfluss der Natur der invertirenden Säure auf diesen Werth liegt eine Arbeit von *O. Gubbe* vor (Ztschr. des Vereins für Rübenzucker-Industrie, December 1884), in welcher auch die weitere Litteratur des Gegenstandes nachgesehen werden kann.

5) In den Ergebnissen der Abschnitte A und B ist der werthvollste Theil der vorliegenden Arbeit enthalten. Die folgenden Paragraphen der Abhandlung berühren Fragen, welche noch gegenwärtig zum Theil nicht genügend beantwortet sind. Bezüglich der im Abschnitt C und D behandelten Gegenstände ist eine Abhandlung von *S. Arrhenius* (Ztschr. für physikalische Chemie IV, 226. 1890) zu vergleichen.

6) Siehe die vorige Anmerkung.

7) Die Vermuthung *Wilhelmy's*, dass die von ihm gefundene Formel auch für andere chemische Vorgänge Geltung besitzt,



hat sich durchaus bestätigt. Eine grosse Zahl späterer Untersuchungen hat ergeben, dass diese Formel in der That das allgemeine Grundgesetz für den Ablauf chemischer Vorgänge einfachster Art in der Zeit ist, und wir müssen daher *Wilhelmy* als den Entdecker des Gesetzes der chemischen Reactionsgeschwindigkeit bezeichnen. Freilich ist es ihm nicht beschieden gewesen, zu erleben, dass von den Chemikern die ihnen gegebene Anregung verwerthet worden wäre.

Leipzig, Juli 1891.

W. Ostwald.

---

### Wilhelmy's Lebenslauf.

*Ludwig Ferdinand Wilhelmy* wurde am 25. December 1812 zu Stargard in Pommern geboren. Nachdem er das Gymnasium seiner Vaterstadt mit dem Zeugniss der Reife verlassen, widmete er sich in Berlin dem Studium der Pharmacie und übernahm dann die bis dahin vom Vater geleitete Apotheke in seiner Heimath. Die Sehnsucht nach einer rein wissenschaftlichen Thätigkeit veranlasste ihn 1843, diese Apotheke zu verkaufen und in Berlin, Giessen und Heidelberg Chemie und Physik zu studiren. 1846 wurde er von der philosophischen Facultät der Universität Heidelberg zum Doctor promovirt auf Grund einer Dissertation »die Wärme, als Maass der Cohäsion.« Nach einem längeren Aufenthalte im Auslande, besonders in Italien, und einer Reise nach Paris, wo ihn vorzugsweise die Vorlesungen und Untersuchungen *Regnault's* anzogen, war er 1849—1854 Privatdocent der Physik an der Universität Heidelberg, lebte ein halbes Jahr in München und dann als Privatmann in Berlin, mit philosophischen, mathematischen und physikalischen Studien beschäftigt.

In seiner Studienzeit hatte *Ludwig Wilhelmy* an dem von *Magnus* geleiteten »physikalischen Colloquium« theilgenommen und mit anderen Mitgliedern dieses Colloquiums 1845 die »physikalische Gesellschaft« gegründet. Eine ganze Reihe später berühmter Namen gehörte zu diesem Kreise junger Naturforscher, von denen hier nur *Beetz*, *E. du Bois-Reymond*, *v. Brücke*, *Clausius*, *v. Feilitzsch*, *Halske*, *Heintz*, *H. v. Helmholtz*, *G. Karsten*, *Knoblauch*, *Krönig*, *Werner v. Siemens*,

*G. Wiedemann* genannt sein mögen. Ein frischer Hauch neuer physikalischer Gedanken verbreitete sich mit ihnen über ganz Deutschland, und als *Wilhelmy* 1855 nach 10jähriger Abwesenheit nach Berlin zurückkehrte, fand er in der »physikalischen Gesellschaft« nur noch wenige der alten Genossen. Aber diese hielten mit ihm treu an der alten Ueberlieferung fest und regten die jüngeren Mitglieder zu neuer wissenschaftlicher Arbeit an.

An ihrem zehnten Geburtstage, den 14. Januar 1855, schrieb die physikalische Gesellschaft zu Berlin einen Preis von 250 Thaler Gold für die befriedigendste Lösung der Aufgabe aus »das mechanische Aequivalent der Wärme experimentell zu bestimmen.« Diese von *Wilhelmy* gestiftete Summe wurde im März 1857 Herrn *G. A. Hirn* in Logelbach bei Colmar überantwortet, entsprechend dem von *Clausius* abgefassten Antrag der Preisrichter, zu denen noch *E. du Bois-Reymond* und *Wilhelmy* gehörten. (Vergl. Berl. Ber. 1855. XI. S. 27). Damit war die Anregung zu weiteren Arbeiten auf demselben Gebiete der Physik gegeben, welche die Wissenschaft Hrn. *Hirn* und Anderen verdankt.

Die physikalische Gesellschaft in Berlin führte *Ludwig Wilhelmy* 1858 auch mit *Georg Quincke* zusammen, jetzt Professor der Physik in Heidelberg, mit dem er bis zu seinem Tode durch enge Freundschaft verbunden war. In *Wilhelmy's* Hause neben dem Anhaltischen Thore in Berlin hatten beide von 1860 bis 1864 ein gemeinsames physikalisches Laboratorium. Hier und auf der Heidelberger Villa, die *Wilhelmy* in seinen letzten Lebensjahren während des Sommers bewohnte, entstanden seine Untersuchungen über Capillarität. Diese sind theilweise unvollendet geblieben, da der Verfasser am 18. Februar 1864 unerwartet an einer Lungenentzündung starb.

Die Arbeiten über die Drehung der Polarisationssebene des Lichtes und über Wärmestrahlung stammen aus der Dozentenzeit des ersten Heidelberger Aufenthalts.

*Ludwig Wilhelmy* war niemals verheirathet. Eine tiefe, ideal angelegte Gelehrten-Natur und gleichzeitig ein gewandter Geschäftsmann, geschult durch die praktische Thätigkeit seiner Jugendzeit, war er unermüdlich bestrebt, seine umfassenden Kenntnisse auf allen Gebieten des Wissens zu erweitern; stets mit warmem Herzen und offener Hand zur Hülfe bereit, wo er helfen konnte; ein Freund der Geselligkeit im kleinen Kreise; im persönlichen Verkehr zurückhaltend und scheu, konnte er in

Freundeskreisen heiter und witzig sein und dann mit überraschender Lebhaftigkeit seine eigenartigen wissenschaftlichen Ansichten vertheidigen. Er schied aus dem Leben mit dem reinen selbstlosen Bedauern, dass ihm nicht vergönnt sein sollte, seine Wissenschaft noch weiter zu fördern.

---

**Verzeichnis der wissenschaftlichen Arbeiten  
von Dr. Ludwig Wilhelmy.**

1. Die Wärme als Maass der Cohäsion. Inaugural-Dissertation. Heidelberg 1846. 8<sup>o</sup>. S. 1—27.
2. Versuch einer mathematisch-physikalischen Wärmetheorie. Heidelberg 1851. 8<sup>o</sup>. S. 1—101.
3. Zur physikalischen Begründung der Physiologie und Psychologie. Heidelberg 1852. 8<sup>o</sup>.
4. Ueber das Gesetz, nach welchem die Einwirkung der Säuren auf den Rohrzucker stattfindet. Pogg. Ann. 81. 1850. S. 413—427; 499—526.
5. Ueber das moleculare Drehungsvermögen der Substanzen. Pogg. Ann. 81, 1850. S. 527—532.
6. Ueber das Gesetz der Wärmeabgabe. Pogg. Ann. 84. 1851. S. 119—135.
7. Ueber die Diathermasie des Glases bei verschiedener Temperatur. Pogg. Ann. 85. 1852. S. 217—226.
8. Ueber die Abhängigkeit der Capillaritäts-Constanten des Alkohols von Substanz und Gestalt des benetzten festen Körpers. Pogg. Ann. 119. 1863. S. 177—217.
9. Ueber die Abhängigkeit des Capillaritäts-Coefficienten der Flüssigkeiten von ihrer Zusammensetzung. Pogg. Ann. 121. 1864. S. 44—63.
10. Ueber die Abhängigkeit der Capillaritäts-Coefficienten der Flüssigkeiten von der chemischen Beschaffenheit und Gestalt der festen Wand. Pogg. Ann. 122. 1864. S. 1—17.

Heidelberg, den 26. Juli 1891.

G. Quincke.





153297

QD501

Wilhelmy, L.

W5

Ueber das Gesetz nach... cop.2

algebr. Functionen  
(81 S.) M 1.50.

Vegetation. (1804.)

(96 S.) M 1.80.

(113 S.) M 1.80.

(1849.) Übers. u. in

E. Blasius. Mit

Ludwig, E. Becher

fig. (43 S.) M —.75.

lungen von Laplace

(1838) und Dirichlet

M 2.—.

ausg. von E. Lom-

r Jonen während der

Taf. Herausg. von

enzoesäure. (1832.)

M 1.—.

er Jonen während

Taf. Herausg. von

e Demonstrationen

4. Tag mit 90 Fig.

ausg. von A. von

, 5. u. 6. Tag, mit

übers. u. herausg. von

ss zum 3.—6. Tag.

stitution der organi-

pp. (86 S.) M 1.40.

akodylreihe. (1837—

it 3 Figuren im Text.

vorkommenden orga-

nischen Verbindungen. (1860.) Übers. u. herausg. von M. u. A.  
Ladenburg. (36 S.) M —.60.

- » 29. Ludwig Wilhelmy, Üb. d. Gesetz, nach welchem die Einwirkung der Säuren auf den Rohrzucker stattfindet. (1850.) Herausg. von W. Ostwald. (47 S.) M —.80.
- » 30. S. Cannizzaro, Abriss e. Lehrganges der theoret. Chemie, vorgetr. an d. k. Universität Genua. (1858.) Übersetzt von Dr. Arthur Miolati aus Mantua. Herausg. von Lothar Meyer. (61 S.) M 1.—.

In Vorbereitung befinden sich:

Bunsen u. Roscoe, Photochemische Untersuchungen.

Kepler, Ausgewählte Arbeiten.

Lambert, J. H., Photometrie. Herausg. von E. Anding (München).

Lavoisier u. Laplace, Über die Wärme.

Mitscherlich, Abhandlung üb. d. Isomorphismus. Herausg. von G. Wiede-  
mann (Leipzig).

Neumann, F., Die mathem. Gesetze der inducirten elektrischen Ströme.

II. Herausg. von C. Neumann (Leipzig).

Wilhelm Engelmann. Google

